

# QUAD-GLOB 200 SL

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning i visse afgrøder, jf. brugsanvisningen.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

## DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 613-4 • Analyse: Diquat dibromid 374 g/l (svarende til Diquat 200 g/l – 16,7 % w/w)  
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmidler/forordningen nr. 1107/2009  
Midlet er et vandopløseligt koncentrat  
Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdato  
Produktionsdato: Se andet sted på emballagen  
Batchnummer: Se emballagen

Emballage: 5 L e

## FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).  
Kan ætse metaller (H290).  
Farlig ved indtægtelse (H302).  
Forsårager hudirritation (H315).  
Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).  
Forsårager alvorlig øjenirritation (H319).  
Gifligt ved indånding (H330).  
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).  
Forsårager organskade ved længerevarende eller gentagne eksponering (H372).  
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).  
Indånd ikke spray (P260).  
Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).  
Der må ikke spises, drikkes eller rygges under brugen af dette produkt (P270).  
Bær beskyttelseshandsker/øjenskytelse/ansigtsbeskyttelse (P280).  
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelle lovpligtige sikkerhedsdatablad.  
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:  
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning i visse afgrøder, jf. brugsanvisningen. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.  
**Ukrudtsbekæmpelse:**  
Må i kartofler ikke anvendes senere end stadiet 14.  
Må i jordbær ikke anvendes senere end stadiet 93.  
Må i sukkerroe, rødbede, gulerod, pastinak, persillerod, kålroe, majroe, radise, sølæg, forårsløg, purløg, porre, fennikel, broccoli, blomkål, savoykål, rosenkål, kinakål, grønkål, spinat, kørvæl, persille, dild, timian, friske ærter og bønner med og uden bælg, sukermajs, knoldselleri, blegselleri, salat, asparges, sætteleg, skalotelæg, hvidløg, rabarber, jordskok og peberrod ikke anvendes senere end stadiet 07.

Må i såede og priklete/udplantede kulturer af nåletræer, løvfældende buske og træer ikke anvendes senere end stadiet 07.  
Må i valmuer og rødkløver ikke behandles senere end 75 dage før høst.

**Nedvisning:**  
Ved nedvisning af kartofler må der ikke behandles senere end 7 dage før høst og kartoffeltoppen må ikke anvendes til foder.  
Nedvisning af ærter til modenhed, raps og rybs. Må ikke behandles senere end 7 dage før høst.

Må i frøafgrøder rødkløver og hvidkløver ikke anvendes senere end stadiet 89.  
Ved nedvisning af frøafgrøder må behandlede afgrøder, halm og frø deraf ikke benyttes til fødevarer og foder.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).  
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtestyrt nær overfladedevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).  
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Etiket nr: III  
GODKENDT

13. juli 2015

for pakninger på 5 L  
Miljøstyrelsen

Frederik Tidmann



Importør:

GLOBACHEM NV

Brustum Industriepark

Lichtenberglaan 2019

B-3800 Sint-Truiden

Tlf + 32 11 78 57 17

www.globachem.com

## Brugsanvisning

### VIKEMÅDE OG VIRKNINGSSPEKTRUM

QUAD-GLOB 200 SL er et kontaktmiddel der virker i planternes grønne dele, hvor QUAD-GLOB 200 SL med hjælp fra lys og varme brintoveller, der ødelægger planternes celler. Virkningen af QUAD-GLOB 200 SL ses meget hurtigt og nedvisningen er skabt i løbet af 3-10 dage.

### AFGRØDER, DOSERING OG SPRØJTEPUNKT

Nedvisning af kartofler Ved tvangsmodning af kartofler kan kartoffels karstregne få en mørk farve, hvis det foregår under ugünstige vejrforhold eller andre stressende betingelser for kartoflerne. Det vil ske uanset hvordan tvangsmodningen af kartoflerne finder sted.

Kartoffernes stadi	Dosering af QUAD-GLOB 200 SL
Med kraftig grøn top (Splittedosering med 4-8 dages mellemrum)	2 X 2,5 l/ha
Ved begyndende afmodning (gulgrøn top) 4-8 dages mellemrum ved splittedosering	1 X 2,5 l/ha eller split i 1 X 1,5 l/ha efterfulgt af 1 X 1,0 l/ha
Næsten afmodnede kartofler (75% vissen)	1 X 1,5 l/ha

Bemærkninger: Der nedvises når knoldene har den ønskede størrelse. Efter ca. 2 uger er knoldene fuldt modne og klar til optagning. Behandlingsfrist: 7 dage.  
Behandlingsstidspunkt og vejrforhold ved nedvisning af kartofler.

Markens tilstand	Tørt og klart vejr samt tørre planter. Det samme vejr forventes resten af dagen.	Høj luftfugtighed, overskyet/diset. Evt. med våde blade på afgrøden.
Jorden er tør:	Anbefalet tidspunkt: Kl. 7.00 – 11.00	Risikabelt – udskyd behandlingen.
Jorden er fugtig:	Anbefalet tidspunkt: Kl. 7.00 – 13.00	
Jorden er mættet med vand:	Anbefalet tidspunkt: Kl. 7.00 – 13.00	

### Nedvisning af frøafgrøder

Afgrøder:	Dosering af QUAD-GLOB 200 SL
Raps og rybs	1 X 2,0 – 2,5 l/ha Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 liter vand. BBCH 80-89 I det udviklingsstadiet har planterne over 50% mørk frø. Svarer også til det tidspunkt hvor rapsen skårlægges.
Frø af rødkløver, hvidkløver	1 X 2,0 – 2,5 l/ha Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 liter vand. BBCH 85-89

Ærter til modenhed (også fremval)	Dosering:	Behandles 7 – 10 dage før høst, BBCH stadiet 87-89, under 30% vand. Spredet-klæbemiddel unødvendigt.
	1 X 2,0 – 2,5 l/ha	

### Ukrudtsbekæmpelse

Afgrøde	Dosering	Bemærkninger
Valmuer	1 X 2,0 l/ha eller 2 X 1,0 l/ha Behandling først når valmuerne har blivende blade. Spiltsprøjtning er oftest bedst. Brug ikke spredet-klæbemiddel.	Valmuer tåler QUAD-GLOB 200 SL efter fremsprøjtning. Behandling først når valmuerne har blivende blade. Spiltsprøjtning er oftest bedst. Brug ikke spredet-klæbemiddel.

Kartofler	Dosering	Bemærkninger
	1 X 1,0-2,5 l/ha	Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 liter vand. BBCH 00-14. Ukrudt bekæmpes på ukrudtets knoldstadiet eller senere når 10-8 af kartoflerne er fremsprøjt.

Jordbær	Dosering	Bemærkninger
	1 X 1,0-2,5 l/ha	Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 liter vand. BBCH 99-01. Afslået sprøjtning efter høst.

Sukkerroe, rødbede, gulerod, pastinak, persillerod, kålroe, majroe, radise, sølæg, forårsløg, purløg, porre, fennikel, broccoli, blomkål, hovekål, savoykål, rosenkål, kinakål, grønkål, spinat, kørvæl, persille, dild, timian, friske ærter og bønner med og uden bælg, sukermajs, blegselleri, knoldselleri, salat og asparges	Dosering	Bemærkninger
	1 X 1,0-2,0 l/ha	Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 liter vand. BBCH 00-07. Såbedet gøres klar, og afgrøden ses på kontakt med rindende. Sprøjtning udføres FØR afgrødens fremsprøjtning, ellers vil denne blive ødelagt.

Sætteleg, skalotelæg, hvidløg, rabarber, jordskok og peberrod	Dosering	Bemærkninger
	1 X 1,0-2,0 l/ha	Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 liter vand. BBCH 00-07. Arealer gøres klar, og afgrøden plantes. Det sprøjtes på fremsprøjtet areal UDEN afgrøden begynder at skyde.
Såede kulturer af nåletræer, løvfældende buske	Dosering	Bemærkninger
	1 X 1,0-2,5 l/ha	Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 liter vand. BBCH 00-07. Sprøjtning udføres FØR afgrødens fremsprøjtning, ellers vil denne blive ødelagt. Ingen sprøjtning på grusdækkede bede.
Priklete/udplantede kulturer af nåletræer, løvfældende buske	Dosering	Bemærkninger
	1 X 1,0-2,5 l/ha	Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 liter vand. Afslået sprøjtning så afgrøden ikke rammes.

### Sprøjteteknik

Ukrudtsbekæmpelse småt ukrudt	Dose nr.:	Tryk i bar:	Hastighed km/t:	Vand l/ha:
	ISO 025, 03, 04	2-3	6-7	150-300
Nedvisning af kartofler	ISO 025, 03, 04	2-3	5	150-400

QUAD-GLOB 200 SL er registreret 10 minutter efter det er udspøjtet.

### Tilberedning af sprøjtevæske

Først fyldes sprøjtes tank halvt op med vand, så tilsættes den beregnede mængde QUAD-GLOB 200 SL og eventuelt sprede-klæbemiddel mens omrørreren kører. Til sidst fyldes op til den ønskede vandmængde. Normalt er det ikke aktuelt at blande med andre midler end sprede-klæbemiddel.

**Omsåning** Alle afgrøder kan sås eller plantes 3 dage efter anvendelsen af QUAD-GLOB 200 SL.

### Rengøring af sprøjtestyrt

Udendigt vask af sprøjte og traktor sker bedst i marken, alternativt på vaskplads med opsamling.  
Sprøjtning skal i marken kunne skylles/vaskes så meget at restvæske i tanken er mindre end 2 % af den oprindelige koncentration af sprøjtemidlet.  
Husk at tømme sprøjtet helt mellem hver skylling/vask, aktivere alle haner og ventiler. Hav tryktest så meget, at overtrykventilen fra det selvrensende filter udløses.  
Findes der ikke en egnet vaskplads med fast udløb, opsamling og afledning rengøres sprøjtet bedst i marken.

ii. Sprøjtet tømtes helt for sprøjtevæske i marken.  
2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjtet med ca. 1/3 af det rene vand fra skyllvands-tanken. Skyllvandet sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er sprøjtet.

3. Fyld næste 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,5 l All Clear Extra. Sprøjt lidt af skyllvandet ud gennem bøl og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrørring og tankpulsedysse køre i mindst 15 minutter. Udsprøjt skyllvaskvandet over den afgrøde der lige er behandlet.

4. Skyll tanken grundigt med den sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllvandet ud over den afgrøde der lige er behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømtes helt i marken.

5. Udendigt rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken, der skal vælges et nyt sted hver gang og pas på afstand til dræn, åbent vand og brønd (i drøkkend vand).

Rengøringen kan også ske hjemme på en plads med opsamling af vaskvand, enten i iglybeholder eller separat beholder.

En uvasket sprøjte skal opbevares under tag, eller i marken på et areal der lige er behandlet. 6. Dyser, filtre og siet kan afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 l vand.

Ved brug af tankpulsedysse og rentvandsstank kan punkt 2 med fordel startes i marken. Er der ligeledes tilstrækkeligt med vand i rentvandsstank kan punkt 3 også startes. Tankpulsedyser og omrørring skal holdes i gang mens der køres hjem.

Der henvises ligeledes til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjte til udbringning af bekæmpelsesmidler jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009.

### Bortskaffelse af emballage

Indholdet i beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Emballagen må ikke genbruges.

**Opbevaring** QUAD-GLOB 200 SL skal opbevares i et aflåst rum eller skab der er mærket med dødningshoved samt teksten "Giflige stoffer". Bør opbevares frostfrit, men tåler let frost.

### Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).  
**TILFÆLDE AF INDTÆGTSELSE:** Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P201).

**VED INDÅNDNING:** Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge. (P304+P340+P311).

**VED KONTAKT MED RINDENDE:** Skyll forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

**VED KONTAKT MED HUDEN:** Vask med rigeligt vand (P302+P352).  
Ved hudirritation eller udløs: Sag lægehjælp (P331+P313).

Ved vedvarende øjenirritation: Sag lægehjælp (P305+P351+P338).  
Ved vedvarende øjenirritation: Sag lægehjælp (P305+P351+P338).  
Alt tilsmedt tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

Vejtransport: UN - nr.: 260 RID/ADR: 8.66 (C)

DK