



Raxil®

IM 035 ES

200 liter

Svampemiddel

Må kun anvendes til bejdsning af vår- og vinterbyg i lukkede industrielle bejdseanlæg



20-11-2012

Raxil®

IM 035 ES

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Skadeligt for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet (R52/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Emballagen må ikke genbruges. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bejdsning af vår- og vinterbyg i lukkede industrielle bejdseanlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Må ikke tømmes i kloakfløb.

Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.

Det bejdsede korn er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Miljøfarlig

Brugsanvisning

Raxil IM 035 ES er et flydende bejdsmiddel til bejdsning af vinter- og vårbyg mod frøbårne svampesygdomme.

Dosering:

150 ml Raxil IM 035 ES pr. 100 kg. udsæd.

Raxil®

IM 035 ES

Virkning mod frøbårne sygdomme

| Afgrøde | Sygdom | Dosering |
|------------------|--|--------------------|
| Vinter og vårbyg | Byggens stribesyge (<i>Drechslera graminea</i>) Nøgen bygbrand (<i>Ustilago nuda</i>) | 150 ml/100 kg korn |

Virkning mod frøbårne svampesygdomme:

Raxil IM 035 ES er særdeles effektivt overfor nøgen bygbrand og bygstribesyge. Raxil IM 035 ES har desuden en høj effekt overfor bygbladplet.

Udsåning:

Under dårlige såbetingelser bør sådybden maksimalt være 4 cm.

Bejdsning:

Bejdsmedlet skal fordeles ensartet så alle kernerne er helt dækket af midlet.

Det er vigtigt, at doseringen holdes nøjagtigt.

Almindelige krav til såsædskvalitet, som vandprocent og høj spireevne/spirekraft, skal være opfyldt.

Hvis midlet opvarmes i forbindelse med bejdsningen, skal det sikres at temperaturen ikke kommer over 40°C i væsken.

Resistens

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens.

Tebuconazol hører til gruppen af DMI-fungicider (FRAC kode 3).

Risikoen for resistensudvikling mod denne gruppe vurderes at være moderat. Imazalil hører til gruppen af imidazoler (FRAC kode 3).

Risikoen for resistensudvikling mod denne gruppe vurderes at være moderat. I Danmark er der ikke registreret resistens hos de svampesygdomme der bekæmpes med Raxil IM 35.

Eventuel resistens kan ikke forudsiges, hvorfor Bayer CropScience ikke hæfter for tab, der kan opstå på denne måde.

Ansvar

Bayer CropScience fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke-forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

Rengøring:

Før og efter bejdsningen bør maskiner, pumper m.m. rengøres med sprit evt. vand.

Opbevaring:

Opbevares frostfrit.

Opbrudt emballage bør lukkes omhyggeligt efter brug.

Behandlet udsæd bør udsås samme år det er bejdsset.

Rester og tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

8.2012

Førstehjælp

Indånding: Bring personen i frisk luft.

Hud: Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder vand.

Øjne: Skyl straks med rigeligt vand i 15 minutter. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg læge.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Svampemiddel, nr. 18-335

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse:

Tebuconazole 15 g/l (1,52 % w/w)

Imazalil 20 g/l (1,99 % w/w)

Benzylalkohol

Ethanol

NETTO 200 liter

Flydende

Fabr. nr. Påtrykt emballagen

Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen. Dato påtrykt emballagen.

® is a registered trademark of the Bayer Group

Bayer A/S
Bayer CropScience
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Telefon 45 23 50 00
www.bayercropscience.dk



Bayer CropScience



5 705628 777208

| | | | |
|-------|-----------------------|-----------------------------|---|
| RIFMO | PMR: | Bayer CropScience DK | |
| | Form.: 396x210 mm | Date: 20-11-2012 | <input checked="" type="checkbox"/> Use only for corrections |
| | Artwork: 200 ltr | Country: DK | <input type="checkbox"/> Print Ready PDF for upload to Server |
| | Job no.: 32-4145/2165 | Colour: CMYK | |