

Etiket nr.: 1

**GODKENDT**  
af Miljøstyrelsen:  
21. juni 2024

For pakninger på:  
1L & 5L

*Franziska Kroll*



# Reglone®

syngenta®

## **Reglone (Dispensation nedvisning purløg fra 21. juni til 1. september 2024)**

### **UKRUDTSMIDDEL**

Må kun anvendes til nedvisning af purløg til frø med en maksimal dosering på 0,5 L/ha udbragt med 40 L vand/ha.

*Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.*

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME logo, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

# 5 L



UN 1760  
CORROSIVE LIQUID, N.O.S.  
(DIQUAT DIBROMIDE)

**FARE**

**EUH401** Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

- H290 Kan ætse metaller.
- H302 Farlig ved indtagelse.
- H315 Forårsager hudirritation.
- H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H331 Giftig ved indånding.
- H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn
- H372 Forårsager skade på øjnene ved længerevarende eller gentagen eksponering.
- H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P234 Opbevares kun i originalemballage.
- P260 Indånd ikke spray.
- P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
- P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280 Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og ansigtsbeskyttelse.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad. Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for plantebeskyttelsesmidler. Dispensation til anvendelse gælder i perioden: 21. juni til 1. september 2024. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 1. september 2024.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til nedvisning af purlog til frø med en maksimal dosering på 0,5 L/ha udbragt med 40 L vand/ha.**

**Ved nedvisning af purlog må halm og frø deraf ikke benyttes til fodevarer og foder.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

Brugere skal anvende kemisk bestandige handsker, visir og beskyttelsesdragt ved blanding og påfyldning og ved udbringning anvende kemisk bestandige handsker, arbejdsdragt og sidde i lukket førerkabine med kulfilter.

Ved inspektion af marker med behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal adfritsreducerende udstyr med minimum 50 % adfritsreduktion anvendes ved udbringning.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte leddyrl (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtestyr nær overfladevand.

**P405+P102** Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

**Må ikke opbevares sammen med fodevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til Giftlinjen eller læge i tilfælde af ubehag.

P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til Giftlinjen eller læge.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P308+P313 VED EKSPONERING eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P314 Søg lægehjælp ved ubehag.

P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

P362+P364 Alt tilmusdet tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

**Ukrudtsmiddel nr. 1-305**

Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation gældende fra 21. juni 2024.

Midlet er et vandopløseligt koncentrat (SL)

Indeholder: 374 g/l (31,8%) diquat dibromid (svarende til diquat 200 g/l).

**Nettoindhold: 5 L**

Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44, 2300 København S, Tel. 32 87 11 00

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen.

UFI: D2V5-23WV-A00M-FDRT



5 707239 200236

**BRUGSANVISNING****01 Produktdata**

Aktivstof	Diquat dibromid 374 g/l (svarende til diquat 200 g/l)
Formulering	Opløseligt koncentrat (SL)
Fareklasse	GHS06, GHS05, GHS08, GHS09
Emballage	5 liter
Opbevaring	Frostfrit (tåler dog frost)

**02 Godkendt anvendelse**

Må kun anvendes til nedvisning af purløg til frø med en maksimal dosering på 0,5 L/ha udbragt med 40 L vand/ha.

**03 Behandlingsfrister og restriktioner**

Brugere skal anvende kemisk bestandige handsker, visir og beskyttelsesdragt ved blanding og påfyldning og ved udbringning anvende kemisk bestandige handsker, arbejdsdragt og sidde i lukket førerkabine med kulfilter.

Ved inspektion af marker med behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj.

SPe3 Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.

SPe3 Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte led dyr.

SP1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

**04 Virkemåde og virkningsspektrum**

Reglone® er et kontaktmiddel. Det virker på planternes grønne dele, hvor Reglone® ved hjælp af lyset danner brintoverilte, der ødelægger plantecellerne. Virkningen af Reglone® ses meget hurtigt og nedvisning sker i løbet af 3-10 dage.

**Resistens**

Diquat bromid tilhører gruppen af Bipirydyliums (HRAC gruppe 22).

**05 Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt**

AFGRØDE	SKADEVOLDER	DOSERING (l/ha)	BEMÆRKNINGER
Purløg til frø	Nedvisning	0,5 L/ha	Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand. Maksimal vandmængde 40 L vand/ha. Max 1 behandling.

## **06 Sprøjeteknik, rengøring m.m.**

### **Sprøjeteknik**

Reglone® skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Afdriftsreducerende udstyr med minimum 50% afdriftsreduktion og maksimal vandmængde på 40 L/ha skal anvendes ved udbringning.

Dette opnås f.eks. ved anvendelse af 02 dyser, et tryk på 1,2 bar og en hastighed på 8 km/t. Yderligere oplysninger om godkendte dyser, som overholder kravene, findes i bilag 1 til Miljøstyrelsens rapport "Brug af afdriftsreducerende udstyr ved sprøjtning med plantebeskyttelsesmidler" Vejledning nr. 46, juli 2020, version 2.4.

### **Tilberedning af sprøjtevæske**

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

**Opblanding:** Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjetanken (dunken omrystes kraftigt inden tilsætning). Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Reglone® i fyldestationen.

Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført.

**Direkte injektion:** Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtes tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

### **Rengøring af sprøjteudstyr**

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæsken kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.

### **Bortskaffelse**

Indholdet i beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Emballagen må ikke genbruges.

### **Opbevaring**

Frostfrit.

Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

## **07 Optimale virkningsforhold**

**Regnfasthed:** Reglone® er regnfast 10 minutter efter udsprøjtning.

**Temperatur:** Reglone® virker uafhængigt af temperaturen, men bør ikke udsprøjtes på frose planter.

**Lys:** I diset og overskyet vejr er virkningen langsommere, men ukrudtsvirkningen er god.

## **08 Tankblanding**

Ved tilberedning af sprøjtevæsken tilsættes Reglone® til sidst.

## **09 Omsåning; efterfølgende afgrøder**

Alle afgrøder kan sås/plantes umiddelbart efter anvendelse af Reglone®.

På ekstremt sandede jorde kan inaktiveringen dog vare op til 3 dage.

## **10 At bemærke**

Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til myndighederne, såfremt den forefindes i original indpakning, opbevares og anvendes forskriftsmæssigt.

Syngenta fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, opstået igennem ikke-forskriftsmæssig opbevaring og anvendelse af produktet.

Opmærksomheden henledes på, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets effekt.

*For mere information om produktet se vores hjemmeside [www.syngenta.dk](http://www.syngenta.dk)*

## **Registrerede varemærker**

*Syngenta Group Company: Reglone®*