

REGLONE

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i visse afgrøder, samt til nedvisning af kartofler og visse afgrøder

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr. 570-11

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Indhold : 5 liter

Analyse : Diquat dibromid 374 g/l 31% w/w (tilsvarende diquat 200 g/l)

Registreringsindehaver:



Herluf Trolles Vej 257
5220 Odense SØ
Tlf 7020 4903

bimærke
Farlig
for
bier

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Giftig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse (R48/25).
Hudirriterende (R38).

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Undgå indånding af aerosoltåger (S23)

Undgå kontakt med huden (S24)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen: Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler

Vask huden efter arbejdet

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse i visse afgrøder. Valmuer må ikke behandles senere end 75 dage før høst.

Nedvisning af kartofler. Må ikke behandles senere end 7 dage før høst.

Kartoffltoppe må ikke anvendes til foder.

Ukrudtsbekæmpelse i visse frøafgrøder. Behandlede afgrøder, halm og frø må ikke benyttes til fødevarer og foder.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer o.l.)

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Emballagen må ikke genanvendes.



Giftig



Miljøfarlig

BRUGSANVISNING

Anvendelse

Reglone er et kontaktmiddel som bruges til nedvisning af visse afgrøder.

Doserings- og anvendelseskema

Afgrøde	Dosering	Bemærkninger
KARTOFLER		
Kraftig top	2 x 2,5 liter/ha	Der nedvisnes når kartoflerne har den ønskede størrelse, eller 14 dage før optagning. Tilsæt ikke sprede/klæbemiddel til nedvisningen
Begyndende afmodning	1 x 2,5 liter/ha eller 2 x 1,5 til 2,0 liter/ha	
Næsten afmodnede	1 x 1,5 liter/ha	
NEDVISNING AF FRØAFGRØDER		
Radis, purløg, spinat,	1 x 2,0 til 2,5 liter/ha	Tilsæt 0,1 liter sprede klæbemiddel pr 100 liter vand
UKRUDTSBEKÆMELSE		
Hvene, hvidkløver, engrapgræs	1 x 2 liter/ha	Sprøjtning udføres i december – februar. I svage engrapgræsmarker bruges ikke sprede/klæbemiddel
Valmue	1 x 2,0 liter/ha eller 2 x 1,0 liter/ha	Valmuer kan tåle Reglone, sprøjt når valmuerne har blivende blade. Tilsæt ikke sprede/klæbemiddel

Sprøjteteknik

Til nedvisning bruges 150 – 400 l/ha vand.

Klima

Reglone er regnfast ½time efter sprøjtning. Sprøjt ikke på frosne planter.

Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld tanken halvt op med rent vand, tilsæt Reglone og eventuelt klæbemiddel fyld resten af vandet i. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen.

Rengøring af sprøjten

Efter sprøjtning rengøres sprøjten med vand og brug et ammoniumbaseret rengøringsmiddel. Tøm sprøjten på det allerede sprøjtede areal efter grundig rengøring.

Bortskaffelse af tom emballage

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Lagring

Lagres frostfrit i uåbnet emballage

Førstehjælp

Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

Indtagelse: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Hudkontakt: Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter. Gå til kontrol hos en øjenlæge.