

L169866 DENM/12Q PPE 4018642



RidomilGold®



MZ Pepite

syngenta®

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME 
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON 
are Trademarks of a Syngenta Group Company

10 KG

TM



Ridomil Gold[®]

MZ Pepite

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63). Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43). Meget giftigt for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37). Brug særligt arbejdstøj (S36). Undgå indånding af aerosoltåger (S23).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må kun anvendes efter stadie 60.

Må ikke anvendes senere end 14 dage inden høst.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (S2).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).

Førstehjælp: Kommer stof på huden vaskes straks med vand og sæbe (S28). Se også sikkerhedsdatabladet punkt 4.

Bortskaffelse: Se brugsanvisningen punkt 6.

Svampemiddel nr. 1-191.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Vanddispergerbart granulat

Analyse: Metalaxyl-M 38,8 g/kg (4% w/w)

Mancozeb 640 g/kg (64% w/w)

Nettoindhold: 10 KG

Batch nr.: Se emballagen.
Produktionsdato: Se emballagen.
Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Syngenta Crop Protection A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S.


Telefon 32 87 11 00



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig



UN3077
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE.
SOLID, N.O.S. (MANCOZEB)



BRUGSANVISNING

01 Produktdata

Aktivstof	Metalaxyl-M 38,8 g/kg (4% w/w), Mancozeb 640 g/kg (64% w/w)
Formulering	Vanddispergerbart granulat
Fareklasse	Sundhedsskadelig (Xn), Miljøfarlig (N)
Emballage	10 KG
Opbevaring	Frostfrit

02 Godkendt anvendelse

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

03 Behandlingsfrister og restriktioner

Må kun anvendes efter stadiet 60. Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).

04 Virkemåde og virkningsspektrum

Ridomil Gold[®] MZ Pepite indeholder de to aktivstoffer metalaxyl-M og mancozeb. Metalaxyl-M tilhører gruppen af phenylamider. Metalaxyl-M er et systemisk middel der hurtigt optages i den grønne plante, og som transporteres op og ud til de yderste bladspidser. Metalaxyl-M bekæmper kartoffelskimlen inde i planten, hæmmer svampens vækst og reproduktion og beskytter ny tilvækst efter sprøjtning. Mancozeb danner en beskyttende film over plantens bladoverflade som hæmmer spiringen af skimmelsporer. Mancozeb forebygger nye angreb. Ridomil Gold[®] MZ Pepite anvendes til bekæmpelse og forebyggelse af kartoffelskimmel i kartofler.

Resistens

Anbefalingerne for brug af phenylamide-baserede produkter er ikke ændret siden 1997. Følgende retningslinjer bør følges:

1. Phenylamider bør anvendes forebyggende
2. Phenylamider bør, som det er tilfældet for Ridomil Gold[®] MZ Pepite, anvendes i en færdigformuleret blanding der består af to effektive blandingspartnere med forskellig virkningsmekanisme
3. Der må maksimalt sprøjtes én gang med phenylamideholdige produkter
4. Phenylamider bør anvendes tidligt i vækstsæsonen mens planterne gror aktivt.

05 Afrøder, dosering og sprøjetidspunkt

AFGRØDE	SKADEVOLDER	DOSERING (l/ha)	BEMÆRKNINGER
Kartofler BBCH 60	Kartoffelskimmel (<i>Phytophthora infestans</i>)	2,0	Må anvendes fra vækststadiet 60 (lige før blomstring). Ridomil Gold® MZ Pepite anvendes i et sprøjteprogram mod kartoffelskimmel med andre midler. Optimalt sprøjetidspunkt: I begyndelsen af en højrisikoperiode for skimmelsmitte, derefter fortsættes sprøjtningerne med andre midler. Max. 1 behandling.

06 Sprøjeteknik, rengøring m.m.

En god og ensartet dækning af kartoffeltoppen er en forudsætning for god effekt. Ridomil Gold® MZ Pepite skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldestyret eller udstyr til direkte injektion.

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt eftersat for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begynder. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Der anvendes en vandmængde på 150-300 l/ha.

Ved anvendelse af præparatfyldestyret og faste præparater fyldes stationen halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjetanken, samtidig med at rent vand tilsættes fyldestationen. Efterfølgende skylles præparatfyldestyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Ridomil Gold® MZ Pepite i fyldestationen.

Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtes tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Rengøring af sprøjteudstyr

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger).

Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger.

Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke bruges til opbevaring af andre bekæmpelsesmidler.

07 Optimale virkningsforhold

Afgrøden skal være i god vækst og ikke hæmmet af tørke eller tidligere sprøjtninger.

Ridomil Gold® MZ Pepite er regnfast, så snart sprøjtevæsken er tørret ind på bladene. Det betyder, at regn 1-2 timer efter udsprøjtning ikke vil påvirke resultatet.

08 Tankblanding

Ridomil Gold® MZ Pepite er den seneste generation granulat. Produktet opløses meget hurtigt ved opblanding, hvilket sikrer en ensartet koncentration af produktet i sprøjtevæsken. Ridomil Gold® MZ Pepite kan blandes med insektmidler som f.eks. Karate® 2.5 WG.

09 Omsåning; efterfølgende afgrøder

Ingen restriktioner.

10 At bemærke

Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til myndighederne, såfremt den forefindes i original indpakning, opbevares og anvendes forskriftsmæssigt. Syngenta fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, opstået igennem ikke-forskriftsmæssig opbevaring og anvendelse af produktet. Opmærksomheden henledes på, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets effekt.

For mere information om produktet se vores hjemmeside www.syngenta.dk

Registrerede varemærker

Syngenta Group Company: Karate®, Ridomil Gold®