

Etikette nr.: II
GODKENDT
17. juni 2015

Riza®

Svampemiddel

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og raps.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Svampemiddel nr. 11-30

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Deklaration: Tebuconazol 250 g/l (26 % w/w)

Indeholder: Midlet indeholder N-methyl 2-pyrrolidon

Type: Midlet er en olie i vand emulsion

Indhold: 5 liter

Godkendelsesinnehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre

Holdbarhed: 2 år efter produktionstidspunktet

Produktionsdato: Se print på dunken

Batchnummer: Se print på dunken

Opbevaring: I uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Kan skade det ufødte barn (H360D).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Bær beskyttelseshandske, beskyttelsestøj og øjensbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at arbejdsmiljøet har regler for arbejde med og utsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelle lovlige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedanstående særligt fremlavede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og raps.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i korn ikke anvendes senere end vækststadium 69.

Må i raps ikke anvendes senere end vækststadium 69.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, sør mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (Sp3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprojestdurst nær overfladevand.

For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningens angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Det må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedstættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsressigt ud fra aktivstofferne respektive maksimale doser i de pågældende afgroder eller afgrodestadier jf. brugsanvisningerne (SPe1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbringe da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONTAKT MED HØJNE: Vask med rigeligt vand (P302+P325).

VED KONTAKT MED ØJENENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skyllning (P305+P351+P338).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

Producent og godkendelsesinnehaver:



Ceminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre

for pakninger på
Miljøstyrelsen 0,25L,
0,5L,
1L, 5L,
10L &
20L

5 Liter



5 703265 937658

10036512

BRUGSANVISNING:

Godkendelse

Riza® må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og raps. Der må maksimalt anvendes 1,0 l/ha Riza®/vækstår, svarende til 250 g/ha tebuconazol. Riza® må anvendes op til 2 gange i en vækstsæson.

Behandlingsrestriktioner

Riza® må ikke anvendes efter BBCH 69.

Riza® må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, sør mv.) for at beskytte organismer der lever i vand.

Riza® må ikke anvendes ved udsgift til snarlig nedbør. Undgå behandling på planter der er så våde, at der er risiko for afsløb af sprøjtevæske.

Virkemåde

Riza® indeholder aktivstoffet tebuconazol. Tebuconazol er et stærkt triazol mod betydende hvedesygdomme. Tebuconazol er en såkaldt ergosterol-hæmmer. Ergosterol er en vigtig fedtsyre i svampens cellemembran, og uden ergosterol vil svampens celleveggel blive slappe og kollapse. Tebuconazol er systemisk og optages hurtigt i bladene efter udspøjning. Tebuconazol transporteres i vedværet (xylemet) nedefra og ud/op mod blade og skudspidser. Den systemiske virkning sikrer en god forebyggende - og i nogen grad helbredende - effekt.

Resistens

Riza® tilhører gruppen af triazoler FRAC gruppe 3. Risikoen for at svampesygdomme udvikler resistens overfor produkter med denne virkemåde vurderes af FRAC at være: Middel (på en lav, middel, høj skala).

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at skifte mellem midler eller blande med effektive midler med forskellige vir-kemekanismer, og at sikre at den samme triazol max. anvendes 2 gange per sæson. Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse. Det gælder også ved anvendelse under unormale kulturturbetingelser. Ligeledes kan sælger ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse.

Optimale virkningsforhold

Effekten af Riza® fremmes af gode vækstbetingelser, så som høj luftfugtighed og temperaturer omkring 20° C. Riza® giver normalt ikke anledning til svindninger af blade og bladspidser i korn og raps, dog frarådes det at sprøjte under ekstreme vejrforhold (varme, tørke, stærkt solskin mv.).

Regn

Riza® optages hurtigt gennem bladene og er regnfast efter en time.

Tabell 1 – anvendelse af Riza®

Må kun bruges til bekæmpelse af svampesygdomme i landbrugsafgrøder

Brugsanvisningens doseringer må ikke overskrides.

Afgrøde	Sygdomme	Timing	Dosis l/ha
Vinter- og vårhvede BBCH 30-69	God effekt på meldug**, gulrust, brunrust og hvedebrunplet moderat effekt på hvedegræplet, hvedebladplet og aksfusarium	Ved første symptomer eller efter risikovurdering	Max 1,0 l/ha Riza® pr. sæson udbragt af 1 eller 2 gange.
Vinter- og vårbyg BBCH 30-69	God effekt på meldug** og bygrust, moderat effekt på skoldplet og bygbladplet	Ved første symptomer eller efter risikovurdering	Max 1,0 l/ha Riza® pr. sæson udbragt af 1 eller 2 gange.
Rug BBCH 30-69	God effekt på meldug** og brunrust samt moderat effekt på skoldplet	Ved første symptomer eller efter risikovurdering	Max 1,0 l/ha Riza® pr. sæson udbragt af 1 eller 2 gange.
Triticale BBCH 30-69	Godt effekt på gulrust, brunrust og meldug**, moderat effekt på hvedegræplet	Ved første symptomer eller efter risikovurdering	Max 1,0 l/ha Riza® pr. sæson udbragt af 1 eller 2 gange.
Havre BBCH 30-69	God effekt på meldug** og kronrust	Ved første symptomer eller	Max 1,0 l/ha Riza® pr. sæson udbragt af 1 eller 2 gange.
Raps BBCH 20-69	God effekt på storknoldet knoldbægersvamp og skulpesvamp. Moderat effekt på gråskimmel	Ved første symptomer eller efter risikovurdering	Max 1,0 l/ha Riza® pr. sæson udbragt af 1 eller 2 gange.

*Der må maksimalt anvendes 1,0 l/ha Riza®/vækstår (2 spøjtrninger af 0,5 l/ha), svarende til 250 g/ha tebuconazol

**God bekæmpelse kan forventes, hvis behandlingen er udført forebyggende. Kun moderate effekter kan forventes, hvis behandlingen er kurativ.

Efterfølgende afgrøde

Ingen restriktioner

Omsåning

Ingen restriktioner

Tilberedning af sprøjtevæsken

Sprøjtebeholderen skal være rengjort før Riza® fyldes i. Fyld 75 % af den ønskede vandmængde i beholderen, tilsæt Riza®, og tilset resten af den ønskede vandmængde. Sæt gang i returløb og omring. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen kan reduceres ved at mindsk omringingen. Ved påfyldning af marksprøje skal anvendes præparatfyldeudsstyr eller udstyr til direkte injektion. Påfyldning af marksprøje skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal, hvor Riza® skal udbringes.

Vaskepladsen må ikke etableres nærmere end:

- 50 m. fra almen vandforsyning til drikkevandsformål.
- 25 m. fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål.
- 50 m. fra overfladevand (vandløb, søer, kystvand) og § 3 -naturbeskyttelsesområder.

Påfyldning på arealer hvor Riza® udbringes, må ikke ske nærmere end:

- 300 m fra almen og ikke almen vandforsyning til drikkevandsformål og
- 50 m fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers rense- og samlebrønde samt § 3 -naturbeskyttelsesområder.

Et areal der anvendes til påfyldning må kun benyttes én gang indenfor en vækstsæson.

Sprøjteknik

Ved udbringning af Riza® bør midlet opblændes med en vandmængde på mellem 150 og 300 l vand/ha, afhængig af afgrødens størrelse. Den højeste vandmængde bruges hvor der er brug for afsætning af produkt ned i tætte afgrøder. Den laveste mængde bruges tidligt på vækstsæsonen i forholdsvis små afgrøder. For at opnå god effekt er det vigtigt, at produktet fordeles jævnligt på alle blade. Overlap og adrift bør undgås.

Under normale vindforhold anbefales det, at anvende en 02 eller 025 low drift dyse. I nedenstående tabel ses en oversigt over disse dysers ydelser ved varierende tryk og hastighed.

Tabel 2 - Eksempler på vandmængder ved brug af 02 (gul) og 025 (lilla) dysen ved forskelligt tryk og kørehastighed.

Dyse	Tryk (2-4 bar)	Km/t (max. 8-10 km/t)	Vandmængde, l/ha
02/025	3,3	4	250/315
02/025	2,6	4	225/279
02/025	3,5	6	175/220
02/025	2,5	6	150/180
02/025	2,5	8	110/140
02/025	2,0	8	100/120

Rengøring af sprøjte

Husk at tomme sprojen helt mellem hver skyllning/vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvensende filter udløses.

1. Sprojen tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes med mindst 50 gange og udspøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau.
2. Straks efter sprøjtingen skyldes sprojen grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllendet ud gennem bom/dyser. Skyllendet kan spøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet.
3. Fyld tanken med 10-15 % af tankkapaciteten (100-150 /1000 l tank) og tilsat 0,5 l ALL CLEAR® Extra pr. 100 l vand. Lad omringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan spøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet.
4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR® EXTRA pr. 10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen.
5. Sprojen fyldes igen med 10-15 % af tankkapaciteten. Lad omringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egen areal.

Vask af marksprøjer og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor Riza® er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson.

Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandelte areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18.12.2014.

Rester og tom emballage

Indholdet/beholderne bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Tom emballage og rester skal afluveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring og holdbarhed

I åbnet emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. 2 års holdbarhed.

Tankblanding

Hvis Riza® blandes eller anvendes i sekvens med andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol, skal der tages højde for, at den totale mængde aktivstof ikke må overskride, hvad der svarer til 1 normaldosering (1 N) per sæson. Tabellen angiver, hvad normaldoseringen (1N=100%) er for de 4 aktivstoffer.

Hvis man f.eks. bruger 0,5 l Riza® (=125 g tebuconazol) i hvede svarer dette til 50% af tebuconazols normaldosering (250 g). Man har derefter mulighed for yderligere at bruge 50% af de nævnte aktivstoffer i tabellen. Sæsonen går fra såning til høst.

Tablet 3 - Doseringer (g aktivstof/ha), som modsvarer en maksimal dosering (1N) af de 4 aktivstoffer i forskelle afgrøder

	Vintersæd	Vårsæd	Raps
Epoxiconazol	125 (=100 %)	125 (=100 %)	Ikke tilladt
Propiconazol	250 (=100 %)	250 (=100 %)	Ikke tilladt
Difenoconazol	250 (=100 %)	Ikke tilladt	Ikke tilladt
Tebuconazol	250 (=100 %)	250 (=100 %)	250 (forår) 175 (efterår og vinter)

Riza® er kemisk kompatibelt med gode formuleringer af svampe-, og ukrudtsmidler. Desuden er Riza® blandbart med gode formuleringer af bladgødskningsprodukter.

Det anbefales at der ikke blandes med produkter der indeholder epoxiconazol (Bell®, Viverda®, Ceando®, Maredo® 125 SC, Opus®, Opera®, Osiris®), propiconazol (Bumper® P, Tilt® 250 EC, Bumper® 25 EC, Stereo® 312,5 EC) Tebuconazol (Prosaro® 250 EC, Orius® 200 EW) eller difenoconazol.

Generelle betingelser og ansvar

Cheimnova A/S fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Registrerede varemærker

Riza® er et registreret varemærke hos Cheminova A/S.

Bell®, Viverda®, Ceando®, Opus®, Opera® og Osiris® er registrerede varemærker hos BASF.

Maredo® 125 SC, Bumper® P, Tilt® 250 EC, Bumper® 25 EC, Stereo® 312,5 EC og Orius® 200 EW er registrerede varemærker hos Adama Northern Europe B.V.

Prosaro® 250 EC er registrerede varemærker hos Bayer CropScience A/S.

All Clear Extra® er et registreret varemærke hos Service Chemicals.