

# Riza® 200 EC

## Svampemiddel

**Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og raps.**

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsæssigt og kræver gyldig autorisation.

Svampemiddel nr. 11-47

Omfatter af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

**Deklaration:** Tebuconazol 200 g/l (20,5 % w/w)  
**Indeholder:** Midlet indeholder N-methyl 2-pyrrolidon  
**Type:** Midlet er et emulgerbart koncentrat.  
**Indhold:** 5 liter  
**Godkendelsesindehaver:** Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre  
**Holdbarhed:** 2 år fra produktionsdatoen  
**Produktionsdato:** Se print på dunken  
**Batchnummer:** Se print på dunken  
**Opbevaring:** I uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

### FARE

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).**

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Forårsager alvorlig øjenskade (H318).

Mistænkt for at skade det ufødte barn (H361d).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskytelse og ansigtsbeskyttelse. (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelle lovpilgigtte sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og raps.**

**Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Må i vinter- og vårhvede ikke anvendes senere end vækststadium 71.**

**Må i vinter-, vårbbyg og havre ikke anvendes senere end vækststadium 65.**

**Må i triticale og rug ikke anvendes senere end vækststadium 69.**

**Må i raps ikke anvendes senere end vækststadium 69.**

**Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. (SP1)**

**For at beskytte grundvandet må der højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1.**

**august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol,**

**propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere**

**produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstofferens respektive maksimale**

**doser i de pågældende afgrøder eller afgrædningstadij. brugsanvisningerne (SPe1).**

**Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

**VED KONTAKT MED HUDEN:** vask med rigeligt vand (P302+P352).

**VED KONTAKT MED ØJNENE:** Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge (P305+P351+P338+P310).

**VED eksponering eller mistanke om eksponering, søg lægehjælp (P308+P313).**

**VED hudirritation eller udslett: søg lægehjælp. (P333+P313).**

Alt tilsmedt tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

Etikette nr. 1

GODKENDT

22. april 2015

for pakninger på  
Miljøstyrelsen

250ml,  
500ml,  
1L, 5L,  
10L &  
20L

# 5 Liter



Producent og godkendelsesindehaver:

**CHEMINOVA**

Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9,  
7673 Harboøre



5 703265 028462

# BRUGSANVISNING:

## Godkendelse

Riza® 200 EC må kun anvendes til bekæmpelse af svampesydomme i korn og raps. Der må maksimalt anvendes 1,25 l/ha Riza® 200 EC/vækstår, svarende til 250 g/ha tebuconazol. Riza® 200 EC må anvendes op til 2 gange i en vækstsæson.

## Behandlingsrestriktioner

Riza® 200 EC må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og raps.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i vinter- og vårhvede ikke anvendes senere end vækststadium 71.

Må i vinter-, vårbyg og havre ikke anvendes senere end vækststadium 65.

Må i triticale og rug ikke anvendes senere end vækststadium 69.

Må i raps ikke anvendes senere end vækststadium 69.

Riza® 200 EC må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer der lever i vand.

Riza® 200 EC må ikke anvendes ved udsigt til snarlig nedbør. Undgå behandling på planter der er så våde, at der er risiko for afløb af sprøjtæske.

## Virkemåde

Riza® 200 EC indeholder aktivstoffet tebuconazol. Tebuconazole er et stærkt triazol mod betydende sygdomme. Tebuconazol er en såkaldt ergosterol-hæmmer.

Ergosterol er en vigtig fedtsyre i svampen cellemembran, og uden ergosterol, vil svampens cellevægge blive slappe og kollapse. Tebuconazol er systemisk og optages hurtigt i bladene efter udsprøjtning. tebuconazol transporteres i vedvævet (xylemet) nedefra og ud/op mod blad og skudspids. Den systemiske virkning sikrer en god forebyggende - og i nogen grad helbredende - effekt.

## Resistens

Riza® 200 EC tilhører gruppen af triazolier FRAC gruppe: 3. Risikoen for at svampesydomme udvikler resistens overfor produkter med denne virkemåde vurderes af FRAC at være: middel (på en lav, middel, høj skala)

Genntag anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at skifte mellem midler eller blande med effektive midler med forskellige virkemekanismer, og at sikre at den samme triazol max. anvendes 2 gange per sæson. Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse. Det gælder også ved anvendelse under unormale kulturbetingelser. Ligeledes kan sælger ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse.

## Optimale virkingsforhold

Effekten af Riza® 200 EC fremmes af gode vækstbetingelser, så som høj luftfugtighed og temperaturer omkring 20° C. Riza® 200 EC giver normalt ikke anledning til sprængning af blade og bladspidser i korn og raps, dog frarådes det at sprøjte under ekstreme vejrforhold (varme, tørke, stærkt solskin mv.).

## Regn

Riza® 200 EC optages hurtigt gennem bladene og er regnfast efter en time.

## Tabel 1 – Brugsanvisning

### Må kun bruges til bekæmpelse af svampesydomme i landbrugsafgrøder

Brugsanvisningens doseringer må ikke overskrides.

Afgrøde	Sygdomme	Timing	Dosis l/ha
Vinter- og vårhvede BBCH 30-71	God effekt på meldug**, gulrust, brunrust og hvedebrunplet, moderat effekt på hvedegråplet, hvedebladplet og aksfusarium	Ved første symptomer eller efter risikovurdering	Max 1,25 l/ha Riza® 200 EC per sæson udbragt af 1 eller 2 gange*
Vinter- og vårbyg BBCH 30-65	God effekt på meldug og byggrust, moderat effekt på skoldplet og bygbladplet	Ved første symptomer eller efter risikovurdering	Max 1,25 l/ha Riza® 200 EC per sæson udbragt af 1 eller 2 gange*
Rug BBCH 30-69	God effekt på meldug og brunrust samt moderat effekt på skoldplet	Ved første symptomer eller efter risikovurdering	Max 1,25 l/ha Riza® 200 EC per sæson udbragt af 1 eller 2 gange*
Triticale BBCH 30-69	Godt effekt på gulrust, brunrust og meldug, moderat effekt på hvedebrunplet	Ved første symptomer eller efter risikovurdering	Max 1,25 l/ha Riza® 200 EC per sæson udbragt af 1 eller 2 gange*
Havre BBCH 30-65	God effekt på meldug og kronrust	Ved første symptomer eller efter risikovurdering	Max 1,25 l/ha Riza® 200 EC per sæson udbragt af 1 eller 2 gange*
Raps BBCH 60-69	God effekt på storkoldet knoldbægersvamp og skulpesvamp, moderat effekt på gråskimmel	Ved første symptomer eller efter risikovurdering	Max 1,25 l/ha Riza® 200 EC per sæson udbragt af 1 eller 2 gange*

\*: Der må maksimalt anvendes 1,25 l/ha Riza® 200 EC/vækstår (2 sprøjtninger af 0,63 l/ha), svarende til 250 g/ha tebuconazol

\*\*.: God bekæmpelse kan forventes, hvis behandlingen er udført forebyggende. Kun moderate effekter kan forventes, hvis behandlingen er kurativ.

## Efterfølgende afgrøde

Ingen restriktioner

## Omsåning

Ingen restriktioner

## Tilberedning af sprøjtevæsken

Sprøjtebeholderen skal være rengjort før Riza® 200 EC fyldes i. Fyld 75% af den ønskede vandmængde i beholderen, tilsæt Riza® 200 EC og tilsæt resten af den ønskede vandmængde. Sæt gang i returløb og omrøring. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen kan reduceres ved at mindske omrøringen. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præperatfyldningsudstyr eller udstyr til direkte injektion. Påfyldning af marksprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal, hvor Riza® 200 EC skal udbringes.

Vaskepladsen må ikke etableres nærmere end:

- 50 m. fra almen vandforsyning til drikkevandsformål.
- 25 m. fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål.
- 50 m. fra overfladevand (vandløb, søer, kystvand) og § 3 -naturbeskyttelsesområder.

Påfyldning på arealer hvor Riza® 200 EC udbringes, må ikke ske nærmere end:

- 300 m fra almen og ikke almen vandforsyning til drikkevandsformål og
- 50 m fra overfladevand(vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers rens- og samlebrønde samt § 3 -naturbeskyttelsesområder.

Et areal der anvendes til påfyldning må kun benyttes én gang indenfor en vækstsæson.

## Sprøjte teknik

Ved udbringning af Riza® 200 EC bør midlet oplandes med en vandmængde på mellem 150 og 300 l vand/ha, afhængig af afgrødens størrelse. Den højeste vandmængde bruges hvor der er brug for afsætning af produkt ned i tætte afgrøder. Den laveste mængde bruges tidligt på vækstsæsonen i forholdvis små afgrøder. For at opnå god effekt er det vigtigt, at produktet fordeles jævnt på alle blade. Overlap og afdrift bør undgås.

Under normale vindforhold anbefales det, at anvende en 02 eller 025 low drift dyse. I nedenstående tabel ses en oversigt over disse dysers ydelser ved varierende tryk og hastighed.

**Tabel 2 - Eksempler på vandmængder ved brug af 02 (gul) og 025 (lilla) dysen ved forskellig tryk og kørehastighed.**

Dyse	Tryk (2-4 bar)	Km/t (max. 8-10 km/t)	Vandmængde, l/ha
02/025	3,3	4	250/315
02/025	2,6	4	225/279
02/025	3,5	6	175/220
02/025	2,5	6	150/180
02/025	2,5	8	110/140
02/025	2,0	8	100/120

## Rengøring af sprøjte

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skyling/vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes med mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimale tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau.
2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gemmen bom/dyser.
3. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet.
3. Fyld tanken med 10-15 % af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank) og tilsæt 0,5 l ALL CLEAR® Extra pr. 100 l vand. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser.
4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR® EXTRA pr. 10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen.
5. Sprøjten fyldes igen med 10-15 % af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egnet areal.

Vask af marksprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor Riza® 200 EC er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson.

Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag.

**I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.**

## Rester og tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (PS01):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæskan.

Emballagen må ikke genbruges.

### Opbevaring og holdbarhed

I uåbnet emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. 2 års holdbarhed.

### Tankblanding

Hvis Riza® 200 EC blandes eller anvendes i sekvens med andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol, skal der tages højde for, at den totale mængde aktivstof ikke må overskride, hvad der svarer til 1 normaldosering (1 N) per sæson. Tabellen angiver, hvad normaldoseringen (1N=100 %) er for de 4 aktivstoffer.

Hvis man f.eks. bruger 0,63 l Riza® 200 EC (= 125 g tebuconazol) i hvede svarer dette til 50 % af tebuconazols normaldoseringen (250 g). Man har derefter mulighed for yderligere at bruge 50 % af de nævnte aktivstoffer i tabellen. Sæsonen går fra såning til høst.

**Tablet 3 - Doseringer (g aktivstof/ha), som modsvare en maksimal dosering (1N) af de 4 aktivstoffer i forskelle afgrøder**

	Vintersæd	Vårsæd	Raps
Epoxiconazol	125 (=100 %)	125 (=100 %)	Ikke tilladt
Propiconazol	250 (=100 %)	250 (=100 %)	Ikke tilladt
Difenoconazol	250 (=100 %)	Ikke tilladt	Ikke tilladt
Tebuconazol	250 (=100 %)	250 (=100 %)	250 (forår) 175 (efterår og vinter)

Riza® 200 EC er kemisk kompatibel med gode formuleringer af svampe-, og ukrudtsmidler. Desuden er Riza® 200 EC blandbart med gode formuleringer af bladgødningsprodukter.

Det anbefales at der ikke blandes med produkter der indeholder epoxiconazol (Bell®, Viverda®, Ceando®, Maredo® 125 SC, Opus®, Opera®, Osiris®), propiconazol (Zenith® 575 EC, Bumper® P, Tilt® 250 EC, Bumper® 25 EC, Stereo® 312,5 EC) Tebuconazol (Proसारo® 250 EC, Follicur® EC 250, Orius® 200 EW) eller difenoconazol.

### Generelle betingelser og ansvar

**Cheminova A/S fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.**

### Registrerede varemærker

Riza® 200 EC er et registreret varemærke hos Cheminova A/S.

Bell®, Viverda®, Ceando®, Opus®, Opera® og Osiris® er registrerede varemærker hos BASF.

Maredo® 125 SC, Bumper® P, Tilt® 250 EC, Bumper® 25 EC, Stereo® 312,5 EC og Orius® 200 EW er registrerede varemærker hos Adama Northern Europe B.V.

Proसारo 250 EC er registrerede varemærker hos Bayer CropScience A/S.

All Clear Extra® er et registreret varemærke hos Service Chemicals.