

ROUNDUP® 2000

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning

Til bekæmpelse af kvik og andet vanskeligt ukrudt samt nedvisning i korn, ærter, hestebønner, græs, korsblomsstrede afgrøder og på stubmarker.

Roundup 2000

Ukrudtsmiddel fra Monsanto



MONSANTO

FORSIGTIG

Vask huden efter arbejdet.

Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal følges ved udbringningen, jf. leverandørbrugsanvisningen for produktet samt f.eks. Informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af følgende fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomsstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs.

Må tillige anvendes til ukrudtsbekæmpelse under frugttræer, i havebrugs-, planteskole- og skovkulturer, på udrykkede arealer, efter såning og før fremspiring samt til selektiv ukrudtsbekæmpelse ved hjælp af specielt udstyr. Under frugttræer må midlet kun anvendes indtil en måned før høst og om efteråret efter høst.

På arealer, hvortil offentligheden har adgang, må midlet ikke anvendes i perioder hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.

Arealer med spiselige afgrøder og foderafgrøder må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr. 48/9

Analyselyst: Glyphosat...34,4% Præparatet (flydende) indeholder 400 g glyphosat pr. liter i form af 541 g glyphosat-isopropylaminsalt.

Monsanto Danmark A/S
Banemarksvej 50 A,
DK-2805 Brøndby
Tlf. 4322 7500

© Monsanto og vindsymboler er registrerede varemærker af Monsanto Company, USA

AGFLO® = varemærke af Monsanto Company

Fabrikationsnr./Produktionsdag:

BRUGSANVISNING

Roundup 2000/Teamup 2000 er ette-komponent middel mod kvik, andre græsser og tokiimbladet ukrudt, samt til nedvisning af ukrudt i korn, ærter, hestebønner og på stubmarker. Roundup 2000 virker ved, at det opløses gennem bladene og fordeler sig med plantens sælbælt rundt hele planten. Efter 10 dage vil denne gennembladede og fordeler sig med plantens sælbælt være tilfældigt, og jorden kan bearbejdes og tilplantes.

Udsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter.

Udsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter.

Udsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter.

Udsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter.

Udsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter.

Udsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter.

Udsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter.

Udsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter.

Udsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter.

Udsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter.

Udsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter.

Udsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter.

Udsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter.

Udsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter.

Udsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter.

Udsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter.

Udsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter.

Udsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter.

Udsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter.

Udsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter. Aerialsprøjtning af Roundup 2000 skal foretages på tørre planter.

Roundup 2000 - Denmark - 50 l drum - DK, 0003, B - 1019 7013.
Nærløst DR, 0004, B - 1017 1908

Doseringen kan reduceres når følgende betingelser er tilstede:

- * Høj luftfugtighed
 - * Høj lufttemperatur over 15 °C.
 - * Høj luftfugtighed (vædringspunkt nær lufthold) til aften.
- Dosering : Roundup 2000 + Teamup 2000 : 1,5 + 2,0
Kvikkemper høje end 25 skud pr. m2 : 2,0 + 2,0

STUBMARKER EFTER FRØGRÆS :

Hilmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken og græsserne kan komme i god vækst. Når kvikken har 3-6 aktive blade, kan der behandles med Roundup 2000. Behandlingen med Roundup 2000 bør altid foretages på ubesøjet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst. Under en passende udvikling, kan der anvendes Roundup 2000 + Teamup 2000. Det er vigtigt at sørge for høj stub, som kan forhindre den aktive genvækst af kvikken og græsserne. Jordbehandling kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen.
Dosering : Roundup 2000 + Teamup 2000 : 2,0-3,5 + 4,0
Genvækst anvendes 2 hver/ha mod kvik og genvækst af frøgræsser . : 2,0 + 2,0
2,0 - 3,5 hver/ha anvendes til bekæmpelse af rødsvingel, enggræsgræs eller andre småbladede frøgræsser.

OMLÆGNING AF GRÆS

Fø aflekt kvikkekæmpelse skal planterne være i aktiv vækst og med 3-6 blade. Før en eventuel direkte såning bør græsset samt andet plantemateriale altid fjernes fra marken (opbudsens eller høst brændes). Dette kan ske allerede 10 dage efter behandling.
Dosering : Roundup 2000 + Teamup 2000 : 1/ha
Kvik og andre bredbladede græsser : 2,0 + 4,0
Småbladede græsser : 2,5 - 3,5 + 4,0

Græs før sidste slået :

Roundup 2000 anvendes til bekæmpelse af kvik og kulturgræsser inden høst af sidste slået. Afgrøden kan anvendes til hø, afgæsning, staldfodring, ensilering eller fælles, fælleskø. Græsset og kvikken (kvik 3-6 aktive blade) bør være veludviklet, 1 god vækst og 15-20 cm på sprøjteløspunktet. Vær sikker på at kvikken er dækket af græsset.

Speserhø og efter behandlingens sidste (10 dage) høstes græsset.
Dosering : Roundup 2000 + Teamup 2000 : 2,0 + 4,0

FORARSANVENDELSE :

Roundup 2000 anvendes mod kvik samt andet tålsøjlet ukrudt. Effekten afhænger dog meget af udviklingsstadiet på kvikken. Kvikken skal have 3-4 blade på sprøjteløspunktet. Ørt foråret vil kvikken normalt ikke være så veludviklet, hvorfor der må påregnes lavere effekt. Ikke alle typer af ukrudt er en sålsøjlet ukrudt, viresædmark kan bekæmpes, så snart vækstpunktet er nået. Dette gælder også ukrudt som det mest almindelige ukrudt.
Dosering : Roundup 2000 + Teamup 2000 : 2,0 + 4,0

Kvikkekæmpelse af korn i udvintret vintersæd : 1,0 + 2,0 + 4,0
Til bekæmpelse af vådt ukrudt før såning af 1. års roet, majs og søer anvendes Roundup 2000 + Teamup 2000 i forbindelse med jordbehandlingssåning.
Dosering : Roundup 2000 + Teamup 2000 : 1/ha : 1,0 + 2,0

DIREKTE SÅNING :

Anvendes direkte såning efter en behandling med Roundup 2000, fjernes halm og andet plantemateriale. Ved spøjning unddelbart efter en direkte såning kræves det, at udsæden er godt dækket.
Dosering : Roundup 2000 + Teamup 2000 : 1/ha : 1,0 + 2,0
Ny tålsøjlet ukrudt : 2,0 + 4,0
Ny tålsøjlet ukrudt : 2,0 + 4,0
Ny tålsøjlet ukrudt : 2,0 + 4,0

Bemærk : Under nedrykning af større mængder plantemateriale, f.eks. høstet, kan der i nogle tilfælde dannes sporezæmme stoffer. En grundig jordbehandling kan forhindre sådanne mulige problemer.

FRUGTPLANTAGER :

Bedste beredningstidspunkt er lige før begyndende blomstring, når ukrudtet er i god vækst. Roundup 2000 må ikke komme i berøring med træernes stammer, løv eller rodstub, ellers træerne da kan skades betydeligt. Især i midten af juni vil der være større risiko for skade på træerne. Dg.a. henkomme rodstub.
Afhængig af træernes størrelse og spøjning.

Pes på vinddrift : Roundup 2000 + Teamup 2000 : 1/ha : 2,0 - 3,0 + 4,0
Kvik og andre græsser bekæmpes med 2 hver/ha. Mod tålsøjlet ukrudt anvendes højeste dosering.

Spild og tom emballage Solix : Spild opsiges med sæbevand eller vand. Samles op i plasticbeholdere til bortskaffelse. Spild eller rester afleveres til destruktions hos den kommunale mødeplads for kemikalierafald.
Større mængder afleveres til Kommunens Kemi.

Forholdsværdier ved bortskaffelse :

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning.