

ROUNDUP®

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning

Mod kvik o.a. flerårige græsser; nedvisning samt tokimbladet ukrudt i korn, græs, korsblomstrede afgrøder, ærter og hestebønner. På stubmarker, i frugtplantager, i havebrugs-, planteskole- og skovkulturer, udyrkede arealer samt til selektiv ukrudtsbekæmpelse med specielt udstyr.

Roundup®

Ukrudtsmiddel fra Monsanto

ROUNDUP®

Ukrudtsmiddel nr. 48/1

Omfattet af miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

ADVARSEL

Irriterer øjnene og huden.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs.

Må tillige anvendes til ukrudtsbekæmpelse under frugttræer, i havebrugs-, planteskole- og skovkulturer, på udyrkede arealer, efter såning og før fremspiring samt til selektiv ukrudtsbekæmpelse ved hjælp af specielt udstyr.

Under frugttræer må midlet kun anvendes indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.

På arealer, hvortil offentligheden har adgang, må midlet ikke anvendes i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.

Arealer med spiselige afgrøder og foderafgrøder må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Undgå kontakt med huden og øjnene.


Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal overholdes ved udsprøjtningen, jf. leverandørbrugsanvisningen for produktet samt f.eks. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Giftig for fisk.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.



Lokalirriterende

Analyse: Glyphosat 30%
Præparatet indeholder 360 g glyphosat pr liter
i form af 480 g glyphosat-isopropylaminsalt.

e 1 liter

Fabrikationsnr:
Produktionsdag:

Opbevares frostfrit

BRUGSANVISNING

ROUNDUP® anvendes til bekæmpelse af kvikgræs og andet en- og flerårigt ukrudt. Det kan også anvendes til nedvisning i korn og tokimbladet ukrudt samt i korsblomstrede afgrøder og ærter. ROUNDUP® virker ved, at det optages gennem bladene og fordeler sig med plantens saftstrøm rundt i hele planten. Efter 10 dage vil denne transport normalt være tilendebragt, og jorden kan bearbejdes og tilplantes.

Udsprøjtning af ROUNDUP® skal foretages på tørre planter. Den bedste effekt opnås, når planterne er i god vækst. Almindelig temperatur, tilpas jordfugtighed og høj luftfugtighed vil sædvanligvis give det bedste resultat. Hvis ROUNDUP® anvendes under andre forhold, må langsommere effekt forventes.

Regn inden 6 timer efter behandling vil normalt forringe virkningen. Roundup bindes umiddelbart til jordens ler- og humusmateriale og inaktiveres derfor ved berøring med denne. Nedbrydning af ROUNDUP® sker hovedsageligt mikrobiologisk til naturligt forekommende stoffer som vand, kuldioxid, ammonium og fosfat. Bemærk at der kan være risiko for, at der i en bestand af samme træarter kan forekomme rodsammenfletninger, og dermed mulighed for overførsel af ROUNDUP® fra et behandlet træ til nabotræet. Pas endvidere på ved behandling af evt. rods kud.

ANVENDELSESOMRÅDER

Udyrkede- og utilplantede arealer:

ROUNDUP® kan anvendes på utilplantede arealer gennem hele vækstsæsonen med 4-6 liter/ha. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingstidspunktet. På tæt og kraftig ukrudtsbestand anvendes 6 liter/ha. 10 dage efter behandling kan jorden bearbejdes og tilplantes. Vandmængde: 200-300 liter/ha.

Rygsprøjte:

Anvendelse af rygsprøjte vil være formålstjenlig, når mindre arealer skal renholdes for ukrudt. F.eks. omkring gården, i hegn og busketter, omkring elmaster o.l. 0,2-0,3 l ROUNDUP® i 10-15 liter vand vil kunne dække et areal på ca. 500 m².

NB! Sprøjt kun på det, der skal bekæmpes. Pas på vinddrift. Anvend evt. afskærmet sprøjtning.

Vandkande med spredebom:

Denne metode er ikke så sikker som rygsprøjte, men kan anvendes med 0,2-0,3 l ROUNDUP® i 10 liter vand, som kan dække et areal på op til 200 m².

Pensling:

Ukrudt tæt ved pryplanter behandles ved pensling med fortyndet ROUNDUP® (ca. 50% opløsning.)

Grankulturer:

I Rødgran, Normannsgran og Kæmpegran kan ROUNDUP® anvendes om efteråret, når strækningvæksten er afsluttet og årsskuddene er modne og endeknopperne er dannede. Tidligst når granerne er rodfaste på blivende sted. Dosering: 3-3,5 l/ha i 400-500 l vand/ha.

Korn før høst:

Til bekæmpelse af kvik, andre græsser samt tokimbladet ukrudt. Korn til udsæd må ikke behandles. Korn skal behandles senest 10 dage før høst. Dosering: 3 l/ha i 100-200 l vand/ha.

Før høst i Ærter, Raps og Hestebønner:

Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nedvisning. Sprøjtningen udføres, når vandindholdet i frøene er under 30%. Behandlingsfrist: Mindst 10 dage. Afgrøder til udsæd må ikke behandles. Dosering: 3-4 l/ha i 100-200 l vand/ha.

Stubmarker:

Til bekæmpelse af kvik og andre græsser, samt tokimbladet ukrudt. Kvikken skal have 3-6 blade og være ca. 15-20 cm høj. For at opnå det bedste resultat må halm og lignende fjernes. Dosering: 4 l/ha (100-200 l vand/ha.)

Græs:

Før sidste slæt sprøjtes når græs og kvik er 10-20 cm høj, og når græsmarken ønskes omlagt. Sprøjt mindst 10 dage før sidste slæt tages. Græsset må anvendes til alle normale formål. Dosering: 3-4 l/ha i 100-200 l vand/ha.

Forholdsregler ved bortskaffelse:

Tom emballage skylles godt med vand. Skyllvandet hældes op i sprøjtevæskan. Den rengjorte, tomme emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning.

Sikkerhed ved oplagring:

Opbevares utilgængeligt for børn. ROUNDUP® skal opbevares tørt og køligt, dog frostfrit. Midlet må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

"Produktet må ikke omformuleres eller omemballeres. Ingen licens er hverken direkte eller indirekte givet under noget U.S. patent". Vi garanterer med sædvanlig latitude for produktets indhold efter given analyse. Af hensyn til de vidt forskellige forhold, hvorunder præparatet kan komme til anvendelse, påtager vi os intet ansvar for mulige direkte eller indirekte skader.

* = varemærke registreret af Monsanto-Searle A/S
VVP-EMB Monsanto B-2040



Monsanto-Searle A/S
Smedeland 6,
2600 Glostrup.
Tlf. 42 45 77 99