

Roundup[®] Flick

Etikette nr: 1
GODKENDT

27. juli 2015

for pakninger på 20 L
Miljøstyrelsen

Syrene Hjortved



GOD EFFEKT, SELV UNDER SVÆRE BETINGELSER



**2 DAGES JORDBEHANDLINGSINTERVAL
(ALM.KVIK)**



EKSTRA GOD REGNFASTHED



MINDRE RISIKO FOR AFDRIFT

DK, 1505, F - 1XXX XXXX

Fabrikationsnr./ Produktionsdag:



Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbe-
kæmpelse samt nedvisning.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plante-
beskyttelsesmiddel må kun købes af professio-
nelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver
gyldig autorisation.

Midlet er et vandopløseligt koncentrat.

Aktivstof: 360 g/l (28,47 % w/w) glyphosatsyre
(i form af 441 g/l (34,86 % w/w) kaliumsalt af
glyphosat)

Ukrudtsmiddel nr.: 48-48

Parti nr.: (se emballage)

Produktionsdato: (se emballage)

Udløbsdato: mindst 2 år efter produktionsdato.

Opbevares kun i den originale beholder

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelses-
middelforordningen 1107/2009.

Dette ukrudtsmiddel er til professionel brug.

I tilfælde af forgiftning, kontakt da

Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12 eller 112

Registreringsindehaver:

Monsanto Crop Science Denmark A/S
Postboks 659 - DK-2200 København N
Denmark

® = Varemærke registreret af
Monsanto Crop Science Denmark A/S
® Monsanto og vinsymbolet er registrerede
varemærker af Monsanto Company, USA
© Monsanto Europe, 2015

INDHOLD: **20 L**

MONSANTO





**Roundup[®]
Flick**



Roundup Flick er et systemisk ukrudtsmiddel, der påføres bladene, for bekæmpelse af såvel græs som bredbladet ukrudt før såning eller plantning af alle typer afgrøder.

Beregnet til behandling af korn og visse andre afgrøder før fremspiring og før høst til hvede, byg, triticale og rug (vinter og vår), raps, sennep (vinter og vår), ærter og bønner, destruktion af græsmarker og bekæmpelse af ukrudt i stub, frugt-plantager, på braklagte arealer, skov, juletræer, juletræer over toppen og på udyrkede arealer og på udyrkede arealer.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.

Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer.

Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP:

Inhalation: Anbring personen i frisk luft, og kontakt en læge.

Hudkontakt: Skyl straks berørte områder grundigt med sæbe og vand. Kontakt en læge, hvis irritationen varer ved.

Øjenkontakt: Skyl straks med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis relevant, og fortsæt med at skylle.

Kontakt en læge, hvis irritationen varer ved.

Indtagelse af produktet: Skyl straks munden, og drik vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt straks en læge.

Information til lægen: Symptomatisk behandling (afgiftning, genoprettelse af vitale funktioner). Ingen specifik modgift er tilgængelig.



LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN, FØR DU BRUGER DETTE PLANTEBESKYTTELSMIDDEL!

FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR MENNESKER OG MILJØ SKAL BRUGSANVISNINGEN FØLGES NØJE

ANVENDELSESFORHOLD

Roundup Flick er et ikke-selektivt ukrudtsmiddel, der bruges til at bekæmpe de fleste typer af såvel etårigt som flerårigt græsukrudt og bredbladet ukrudt. Roundup Flick optages gennem bladene og transporteres rundt i hele planten.

Behandling med Roundup Flick bør foretages på tørre planter. Den bedste virkning opnås, når planterne er i aktiv vækst. Ved en minimummængde på 1800 g aktivstof/ha kan bearbejdning af jorden finde sted 1 dag efter behandling på etårigt bredbladet ukrudt, 2 dage efter behandling af almindelig kvik og 5 dage efter behandling af andet flerårigt ukrudt.

Ukrudtet bør sprøjtes, når luften er tilstrækkeligt fugtig, og lufttemperaturen er mellem 0-30 °C, når ukrudtet er i god vækst og ikke skadet af tørke eller frost. Ukrudtet skal sprøjtes mindst 4 timer, før det begynder at regne.

Produktet bliver hurtigt inaktivt i jorden og forhindrer ikke, at nyt ukrudt spirer frem fra frø.

DER BØR UDVIKLES EKSTREM FORSIGTHED FOR AT UNDGÅ UTILSIGTET SPREDNING VED VINDDRIFT, DA DETTE KAN FORÅRSAGE ALVORLIGE SKADER PÅ TILSTØDENDE AFGRØDER ELLER PLANTER.

Bemærk, at i en bestand af træer af samme art, kan der være risiko for, at rodforbindelser forekommer og forårsager overførsel af Roundup Flick fra et behandlet træ til ubehandlede tilstødende træer. Afgrøder, der er bestemt til produktion af udsæd, bør ikke behandles. Behandling af rodkud kan beskadige modertræet.

Bemærk: Under nedbrydningen af en større mængde plantemateriale som f.eks. kvikrødder kan der i nogle tilfælde dannes spiringshæmmende stoffer. En grundig jordbearbejdning kan forebygge eller reducere problemet.

SKEMA OVER ANVENDELSESOMRÅDER:

AFGRØDER OG/ELLER SITUATIONER	SKADEGØRERE OG DOSERING (LITER/HA)	ANBEFALET FREMGANGSMÅDE
FØR SÅNING OG EFTER SÅNING / FREMSPIRING	<i>Bekæmpelse af kvikmængde med min dre end 25 skud/m²: 3,00 l/ha.</i> <i>Bekæmpelse af kvikmængde med mere end 25 skud/m²: 4,00 l/ha.</i> <i>Bekæmpelse af kornplanter i en mark hvor afgrøden er udvintret: 1,00 l/ha</i> <i>Maksimalt 1 behandling/år</i>	Behandles op til 2 dage før såning eller plantning. Ukrudt: 2-6 blade. Vandmængde: *Traktormonterede sprøjter med hydrauliske dyser: 50-200 l/ha * Håndholdte sprøjter (rygsprøjter) med hydrauliske dyser: 250-500 l/ha
HVEDE, BYG, TRITICALE OG RUG (VINTER OG VÅR) / FØR HØST	Kvikmængde mindre end 25 skud pr. m ² : 2,00 l/ha Kvikmængde større end 25 skud pr. m ² : 3,00 l/ha <i>Maksimalt 1 påføring / år</i>	Korn til udsæd må ikke behandles. Behandlingen foretages senest 10 dage før høst, når vandprocenten i kernerne er 30 % eller derunder. Dette kan kontrolleres ved at presse tommelfingerneglen hårdt mod korn fra forskellige områder. Hvis fordybningen holder på alle kærnerne, er afgrøden klar til sprøjtning. Vandmængde: *Traktormonterede sprøjter med hydrauliske dyser: 50-200 l/ha

AFGRØDER OG/ELLER SITUATIONER	SKADEGØRERE OG DOSERING (LITER/HA)	ANBEFALET FREMGANGSMÅDE
RAPS, SENNEP (VINTER OG VÅR) / FØR HØST	Etårigt og flerårigt græs og bredbladet ukrudt: 3,00 l/ha <i>Maksimalt 1 behandling/ år</i>	Afgrøder bestemt til udsæd må ikke behandles. Behandlingen foretages senest 10 dage før høst, når den gennemsnitlige fugtighed i frøene er 30 % eller derunder. Vandmængde: *Traktormonterede sprøjter med hydrauliske dyser: 50-200 l/ha
ÆRTER / FØR HØST	<i>Kvikmængde med mindre end 25 skud/m²: 2,00 l/ha.</i> <i>Kvikmængde med mere end 25 skud/m²: 3,00 l/ha.</i> <i>Nedvisning: 4,00 l/ha</i> <i>Maksimalt 1 behandling/ år</i>	Afgrøder bestemt til udsæd må ikke behandles. Behandlingen foretages senest 10 dage før høst, når 75 % af bælgene er blevet brune, og den gennemsnitlige vandprocent i kernerne er 30 % eller derunder. Vandmængde: *Traktormonterede sprøjter med hydrauliske dyser: 50-200 l/ha
BØNNER / FØR HØST	<i>Bekæmpelse af kvik og andet ukrudt: 3,00 l/ha.</i> <i>Nedvisning: 4,00 l/ha</i> <i>Maksimalt 1 behandling/ år</i>	Afgrøder bestemt til udsæd må ikke behandles. Behandlingen foretages senest 10 dage før høst, når 75 % af bælgene er blevet brune, og den gennemsnitlige vandprocent er 30 % eller derunder. Vandmængde: *Traktormonterede sprøjter med hydrauliske dyser: 50-200 l/ha
FRUGTPLANTAGER (alle arter)	Kvik og andre bredbladede græsser: 3,00 l/ha <u>Flerårige græsser:</u> 6,00 l/ha <i>Maksimalt 3 påføringer / år</i>	Må ikke komme i kontakt med træer, løvhang eller rodkud. Kun frugtræer, der mindst er 2 år gamle, kan sprøjtes. Især i midten af juni vil der være større risiko for skade på træerne pga. fremkomne rodkud. Anvend afskærmet sprøjtning. Vandmængde: *Traktormonterede sprøjter med hydrauliske dyser: 50-200 l/ha *Håndholdte sprøjter (rygsprøjter) med hydrauliske dyser: 250-500 l/ha

AFGRØDER OG/ELLER SITUATIONER	SKADEGØRERE OG DOSERING (LITER/HA)	ANBEFALET FREMGANGSMÅDE
DESTRUERING OG FORNYELSE AF GRÆSMARKER	Kvik og andre bredbladede græsser: 4,00 l/ha Smalbladede græsser: 5,00 l/ha - 6,00 l/ha <i>Maksimalt 1 behandling/ år</i>	Enten skal behandling foretages mindst 10 dage før afsluttet afgræsning / græsslåning i juni/ oktober, eller behandling af genvækst skal foretages efter afgræsning / græsslåning. Vandmængde: *Traktormonterede sprøjter med hydrauliske dyser: 50-200 l/ha *Håndholdte sprøjter (rygsprøjter) med hydrauliske dyser: 250-500 l/ha
GRÆS FØR SIDSTE SLÆT	Etårigt og flerårigt græs og bredbladet ukrudt: 4,00 l/ha <i>Maksimalt 1 behandling/ år</i>	Behandling skal foretages 10 dage før høst af græsset. Græs og ukrudt bør være i god vækst. Afgrøden kan anvendes til afgræsning, foder, fremstilling af ensilage, hø eller foderpilller. Vandmængde: *Traktormonterede sprøjter med hydrauliske dyser: 50-200 l/ha
BRAKLAGTE OMRÅDER / BRAKJORD	Etårigt og flerårigt græs og bredbladet ukrudt: 3,00 l/ha - 5,00 l/ha <i>Maksimalt 1 behandling/ år</i>	Jordbearbejdning kan påbegyndes efter 5 dage. Vandmængde: *Traktormonterede sprøjter med hydrauliske dyser: 50-200 l/ha *Håndholdte sprøjter (rygsprøjter) med hydrauliske dyser: 250-500 l/ha
FORBEREDELSE AF JORD TIL SKOVBRUG (SKOVREJSNING) OG PLANTESKOLER,	Kvik og andre bredbladede græsser: 3,00 l/ha <u>Flerårige græsser:</u> 6,00 l/ha <i>Maksimalt 3 behandlinger/ år</i>	Sprøjt fra juni til august. Må ikke komme i kontakt med træer, løvhang eller rodkud. Vandmængde: *Traktormonterede sprøjter med hydrauliske dyser: 50-200 l/ha *Håndholdte sprøjter (rygsprøjter) med hydrauliske dyser: 250-500 l/ha *Roterende forstøvere: 10-50 l/ha

AFGRØDER OG/ELLER SITUATIONER	SKADEGØRERE OG DOSERING (LITER/HA)	ANBEFALET FREMGANGSMÅDE
NÅLETRÆSPANTAGER (inklusive juletræer)	Etårigt og flerårigt græs og bredbladet ukrudt: 2,00 l/ha - 3,50 l/ha <i>Maksimalt 3 behandlinger/ år</i>	Må ikke komme i kontakt med træer. Anvend afskærmet udstyr. Vandmængde: *Traktormonterede sprøjter med hydrauliske dyser: 50-200 l/ha *Håndholdte sprøjter (rygsprøjter) med hydrauliske dyser: 250-500 l/ha *Roterende forstøvere: 10-50 l/ha
TRÆSTUBBE	20 % opløsning	Med henblik på at forebygge genvækst af skud efter fældning af buske eller træer kan stubbe behandles med Roundup Flick straks efter fældning. Stubbe kan behandles ved hjælp af rygsprøjte eller ved at bruge en pensel til at påføre snitfladen med en opløsning af Roundup Flick. Den bedste tid for behandling er fra oktober til februar. Behandling af træer i saftstigningsperioden har ringere effekt. Brug frostvæske (20 %) ved temperaturer under - 5 °C.
JULETRÆER OVER TOPPEN	Etårigt og flerårigt græs og bredbladet ukrudt: 3,50 l/ha <i>Maksimalt 1 behandling/ år</i>	Anvendes i rødgran, Nordmannsgran og kæmpegran. Kan bruges om efteråret, når den årlige vækst er afsluttet, og forårs-skuddene er modne, og endeknopperne er dannet. Påføres tidligst, når grantræerne er groet godt fast på det permanente sted. Vandmængde: *400-500 l/ha Må kun udføres ved hjælp af en traktorsprøjte for at få en ensartet dosering.

AFGRØDER OG/ELLER SITUATIONER	SKADEFØRERE OG DOSERING (LITER/HA)	ANBEFALET FREMGANGSMÅDE
PÅSTRYGNING PÅ UKRUDT, DER ER HØJERE END AFGRØDEN	Etårigt og flerårigt græs og bredbladet ukrudt, der er højere end afgrøden: 33 til 44 % opløsning	Berør ikke afgrøden med ukrudtsstrygeren. Anvendes på ukrudt, der er 20 cm højere end afgrøden.
	<i>Maksimalt 1 behandling/ år</i>	
IKKE-LANDBRUGSMÆSSIGE OMRÅDER (højspændingsledninger, olieledninger, gasforsyningsledninger, vejsider, langs jernbaner og andre udyrkede arealer...)	Etårigt og flerårigt græsukrudt og bredbladet ukrudt: 4,00 l/ha - 6,00 l/ha	Rygsprøjte er velegnet, når små områder skal holdes fri for ukrudt. F.eks. omkring haven, ved hække og buske, omkring elmast, etc. NB.: Sprøjt kun på det, der skal bekæmpes. Pas på vinddrift. Brug afskærmet sprøjtning, hvis det er muligt. Vandmængde: *Traktormonterede sprøjter med hydrauliske dyser: 50-200 l/ha *Håndholdte sprøjter (rygsprøjter) med hydrauliske dyser: 250-500 l/ha
	<i>Maksimalt 3 behandlinger/ år</i>	

SPRØJTER:

Roundup Flick kan sprøjtes effektivt ved hjælp af traktormonterede standard-sprøjter med hydrauliske dyser og håndholdte sprøjter (rygsprøjter) med hydrauliske dyser.

Traktormonterede sprøjter og håndholdte sprøjter (rygsprøjter) med roterende forstøvere, bør kun bruges i skove og nåletræsplantager. Når sådanne sprøjter benyttes, bør diameteren af de sprøjtede dråber være 200-300 µm. Den minimale vandmængde bør være meget begrænset, afhængigt af den anvendte sprøjte og produkt-dosering:

Når der sprøjtes med en traktormonteret sprøjte med roterende forstøvere, skal der bruges en vandmængde på mindst 10 l/ha til en produkt-dosering på 4,00 l/ha eller derunder. Hvis den minimale produkt-dosering er 6,00 l/ha, skal der bruges en vandmængde på mindst 20 l/ha.

Når der sprøjtes med en håndholdt sprøjte (rygsprøjte) med roterende forstøvere, skal der bruges en vandmængde på mindst 40 l/ha til en produkt-dosering på 4,00 – 6,00 l/ha.

I visse tilfælde kan der bruges særlige injektorer, påføringsudstyr og andet udstyr (ukrudtsstrygere).

Før sprøjtning påbegyndes, skal du kontrollere sprøjtes pumpe, trykmåler og dyser. Udskift alle dele, der er slidte eller beskadigede. Sprøjtningen skal være ren og i god teknisk stand. Brug kun rent, ublandet vand til opløsningen. Sprøjt ikke i blæsevejr.

Valg af dyser: f.eks. lavdrift-dyse, Hardi ISO LD 02-110 eller ISO 03-110.

SÅDAN BLANDES OPLØSNINGEN:

Fyld 2/3 af sprøjten med rent vand. Hæld den påkrævede mængde Roundup Flick i, og bland væsken. Hæld den resterende mængde vand i, og bland væsken godt.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjtningen skal være monteret med spuledysen til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjt-væske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjt-væske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig

med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. December 2014.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER:

Ved håndtering af det ufortyndede produkt og ved berøring af overflader, der har været udsat for produktet, skal der bæres kemikaliebestandige handsker, der opfylder EN 374-standarden – f.eks. handsker, der er lavet af nitril eller neopren (≥ 0,5 mm). Det anbefales at benytte beskyttelsesbriller eller en ansigtsskærm (der opfylder EN 166-standarden).

Når der sprøjtes med en traktormonteret mark-sprøjte med hydrauliske eller roterende dyser, skal der bæres kemikaliebestandige handsker, der opfylder EN 374-standarden – f.eks. handsker, der er lavet af nitril eller neopren (≥ 0,5 mm).

Når der sprøjtes med en håndholdt sprøjte (rygsprøjte) med hydrauliske eller roterende dyser, skal der bæres beskyttelsestøj af type 4, der beskytter mod flydende kemikalier (og opfylder EN 14605-standarden), samt tætte støvler. Der skal også bæres kemikaliebestandige handsker, der opfylder EN 374-standarden – f.eks. handsker, der er lavet af nitril eller neopren (≥ 0,5 mm). Det anbefales at benytte beskyttelsesbriller eller en ansigtsskærm (der opfylder EN 166-standarden). Hvis der er risiko for inhalering af produktet, skal der bæres åndedrætsværn, der filtrerer væske og faste partikler (EN 149; klasse FFP2) eller en ansigtsmaske med P2-filtre (EN 14387).

Medarbejdere må først gå ind i behandlede områder, når produktet, der er sprøjtet på planterne, er tørt. Det anbefales, at de bærer handsker, lange bukser, langærmede trøjer og lukkede sko eller støvler.

Hygiejne. Indånd ikke sprøjtetåger fra produktet. Produktet må ikke komme i kontakt med øjnene. Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, så skyl øjnene med vand, og kontakt en læge. Det er ikke tilladt at spise, drikke eller ryge under arbejdet og i det område, hvor produktet opbevares. Vask hænder og andre ubeskyttede kroppsdele før måltider og efter arbejdet. Handsker, der har produktet på deres overflade, skal vaskes grundigt. Forurenet tøj skal fjernes og renses. Hvis personligt beskyttelsesudstyr ikke kan renses, skal det destrueres i henhold til de gældende lovmæssige krav.

Behold produktets originale etikette, indtil produktet er brugt op, og emballagen er rensat og destrueret.

Beskyttelse under/i forbindelse med brug:

Vær iført egnet beskyttelsestøj og -handsker.

Vask hænder og ubeskyttet hud efter brug. Stærk skal afvaskes straks.

Miljøbeskyttelse:

Foruren ikke vand med produktet eller dets beholder (rengør ikke sprøjteudstyr i nærheden af overfladevand/ undgå forurening via afløb fra gårdspladser og veje).

Undgå udslip i miljøet. Der henvises til specifikke instruktioner/sikkerhedsdatablade.

Må ikke anvendes mindre end 2 meter fra vandmiljøer (vandløb og søer, etc.) for at beskytte vandlevende organismer

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE:

Skal opbevares utilgængeligt for børn. Skal holdes væk fra fødevarer, drikkevarer og dyrefoder. Skal opbevares sikkert i den originale, tilkukkede emballage, og ved en temperatur mellem frysepunktet og ikke over +50 °C. Egnede opbevaringsmateriale: rustfrit metal, glasfiber, plast, glas. Uegnet opbevaringsmateriale: galvaniseret metal, blanke letmetaller. Produktet kan krystallisere, hvis Roundup Flick opbevares ved temperaturer, der er under den anbefalede temperatur. Når produktet optøes ved stuetemperatur og rystes, får det sin normale konsistens igen. Produktets mindste holdbarhed: 2 år.

GENEREL ERKLÆRING OM RESISTENS

Alle ukrudtspopulationer kan indeholde planter, der er mere tolerante eller resistente over for visse herbicider, hvilket kan føre til utilstrækkelig bekæmpelse. Glyphosat er et gruppe G-herbicid baseret på virkningsklassificeringer tildelt af Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)

Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. Der skal indføres en strategi mod ukrudt der tilgodeser alternative muligheder for bekæmpelse for at undgå herbicidresistens. Dette omfatter den korrekte brug af herbicider samt benyttelse af herbicider med forskellige virkningsmekanismer eller brug af mekaniske metoder til ukrudtsbekæmpelse.

- Følg anbefalingerne på etiketten, navnlig for at sikre, at behandlingen foretages i ukrudtets korrekte vækstfase under passende klimatiske forhold og ved korrekt dosering.
- Brug et bredt udsnit af de værktøjer, der udgør en del af de normale programmer for bekæmpelse af ukrudt i afgrøder eller landskaber (f.eks. sædskifte, såtidspunkt, mekanisk bekæmpelse).

- Minimer risikoen for spredning af ukrudt. Sørg for at redskaber er rensat for jord og planter når det flyttes mellem markerne.
- Følg altid god sprøjtepraksis for at opnå en effektiv ukrudtsbekæmpelse:
 - o Sprøjteudstyret skal kontrolleres regelmæssigt (f.eks. af autoriserede personer).
 - o Dosér og sprøjt præcist – kalibrer sprøjten og klargør den korrekte mængde sprøjteblanding til det område, der skal behandles.
 - o Brug de rigtige dyser for at optimere dækningen af planterne. Det anbefales at anvende lowdriftsdyser eller brug af dyser med mindst mulig afdrift.
 - o Følg ukrudtet efter en behandling for at kontrollere bekæmpelseseffekten og for tidligt at identificere eventuel resistensudvikling.
 - o Fjern eventuelt overlevende ukrudt mekanisk eller med andre effektive metoder end glyphosat før de producerer frø.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til din forhandler eller din lokale Monsanto repræsentant.

DESTRUERING AF TOM EMBALLAGE:

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501)

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

REGISTREREDE VAREMÆRKER

XXXX – Monsanto, USA

BEMÆRK!

Registreringsindehaveren garanterer kvaliteten af produktet og dets bestanddele. Anbefalingerne på etiketten er baseret på langvarige markforsøg og erfaringer inden for industrien. Registreringsindehaveren er ikke ansvarlig for ringe resultater, der kan opstå, hvis forholdene ændres på en måde, der ikke kunne have været forudsat ved tidspunktet for registreringen og markedsføringen af dette plantebeskyttelsesprodukt.



Roundup Flick er et systemisk ukrudtsmiddel, der påføres bladene, for bekæmpelse af såvel græs som bredbladet ukrudt før såning eller plantning af alle typer afgrøder.

Beregnet til behandling af korn og visse andre afgrøder før fremspiring og før høst til hvede, byg, tritcale og rug (vinter og vår), raps, sennep (vinter og vår), ærter og bønner, destruktion af græsmarker og bekæmpelse af ukrudt i stub, frugtplantager, på braklagte arealer, skov, juletræer, juletræer over toppen og på udyrkede arealer og på udyrkede arealer.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.

Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer.

Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP:

Inhalation: Anbring personen i frisk luft, og kontakt en læge.

Hudkontakt: Skyl straks berørte områder grundigt med sæbe og vand. Kontakt en læge, hvis irritationen varer ved.
Øjenkontakt: Skyl straks med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis relevant, og fortsæt med at skylle.

Kontakt en læge, hvis irritationen varer ved.

Indtagelse af produktet: Skyl straks munden, og drik vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt straks en læge.

Information til lægen: Symptomatisk behandling (afgiftning, genoprettelse af vitale funktioner). Ingen specifik modgift er tilgængelig.

