

Etikettnr.: II
GODKENDT
17. oktober 2017
for pakninger på
Miljøstyrelsen

100ml

NY
100 mL

KLAR TIL BRUG
STRONG

ROUNDUP®

GEL
MAX

UKRUDTSMIDDEL

GEL

Må kun anvendes til
visse former for
ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.
Dette plantebeskyttelsesmiddel
kan købes og anvendes af ikke-
professionelle, fx private haveejere, og
kræver ikke autorisation.

**Bekæmper Vedbend,
Brombær, Tidsler,
Brændenælder og andre
ukrudt med dybe rødder**

**Forhindrer genvækst fra
træstubbe**

En berøring er nok



12628342

roundup.dk

Print zone
Drukzone
Zone d'impression
Druckfläche

Text zone
Tekstzone
Zone de texte
Textfläche

Open here
Hier öffnen
Ouvrir ici
Hier öffnen

Adhesive zone
Lijmzone
Zone de colle
Klebefläche

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf. Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

- Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
- Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt
- Produktet (SP1).
- Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
- Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP: Øjenkontakt: Skyl omgående med rigelig vand. Fjern om muligt kontaktlinser. Hudkontakt: Fjern forurenet tøj, ur og smykker. Vask berørt hud med rigelig vand. Vask tøj og rengør sko for genanvendelse. Indånding: Anbring i frisk luft. **Indtægelse:** Giv straks vand at drikke. En bevidstløs person må aldrig gives noget gennem munden. Opkastning må IKKE fremtvinges, med mindre sundhedspersonale har foreskrevet det. Søg læge, hvis der opstår symptomer.

DEKLARATION
Ukrudtsmiddel nr. 48-54

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmidelforordningen 1107/2009

Indeholder glyphosat 72 g/l (6,59% w/w) svarende til glyphosatsyre kaliumsalt 88 g/l (8,11% w/w) 2,5 % af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut inhalationskøbskarakter.

Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 220-239-6]. Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).

Midlet er en gel til direkte anvendelse. Se venligst nederst i venstre hjørne. Holdbarhed er mindst 2 år fra produktionsdato.

GODKENDELSESINDEHAVER: DISTRIBUTOR:
Monsanto Crop Sciences Denmark A/S Econova A/S
Panteks 659, Tomtehaven 16
2200 København N 2340 Skovlunde
www.roundup.dk Tlf. nr. 44927500


Batchnr./ Produktionsdato:

100 ml e

XXXXXXXXXXXXXXXXXX


Brombær


Brændenælder


Træstubb

ROUNDUP Gel Max
Bekæmper ukrudt også dets rødder, og kan bruges mod uønskede planter som f.eks. brombær, brændenælder, tidsler osv. Roundup Gel Max forhindrer genvækst fra rødderne.
Kan også anvendes på friskt afskårne stubbe på forskellige træagtige ukrudtstyper, vedbend (efeu) og træer.

† Registreret varemærke af Monsanto Technology LLC.

ÅBEN HER FOR MERE INFORMATION

12638343

68.0 mm

HVAD ER ROUNDUP GEL MAX?

Roundup Gel Max er et total-ukrudtsmiddel, som bekæmper store og besværlige ukrudtsplanter som f.eks. skræpper, brændenælder, skvalderkål, snerler, tidsler og brombær. Det kan også anvendes på stubben af nyfældede træer og forskellige træagtige ukrudtstyper, vedbend(efeu) og træer.

Det nedbrydes af mikroorganismer i jorden, så denne er klar til såning/plantning.

HVAD KAN DU FORVENTE AF ROUNDUP GEL MAX?

Roundup Gel Max bekæmper ukrudt efter bare en enkelt behandling, når det anvendes ifølge instruktionen. Den første synlige effekt ses på bladene efter 10-15 dage, afhængigt af ukrudtstypen og vejrforhold.

Det kan tage op til 28 dage at nedvise planten, igen afhængigt af ukrudtstype og vejrforhold.

BRUGSANVISNING**Ukrudt**

Påfør Roundup Gel Max, når ukrudtsplanterne er grønne og i god vækst.

Start med de største blade, og påfør gelen på ca. 30% af bladene. Første effekt ses på bladene indenfor 10-15 dage. Full nedvisning kan dog tage op til 28 dage, afhængigt af ukrudtstype og vejrforhold.

† Træstubb/Træagtige ukrudtsplanter:

Påfør den friske snitflade med 1 klik for en diameter på 2-4 cm, flere klik for større flader. Rødder/stubb viser muligvis ikke synlig effekt, men næste sæson bør de ikke gro igen. Besværlige og store ukrudtsplanter.

Påfør Roundup Gel Max, når ukrudtsplanterne er grønne og i god vækst.

Start med de største blade, og påfør gelen på ca. 30% af bladene.

Ukrudtstype	Ukrudtstype	Bladområde, som skal behandles
Besværligt ukrudt som f.eks. skræpper, brændenælder, skvalderkål, snerler og tidsler	1 klik	30 x 40 cm
Brombær, unge træer og andre træagtige ukrudtsplanter	2 klik	30 x 40 cm

Vent 5 dage, før du graver eller bearbejder jorden, så Roundup Gel Max har tilstrækkelig tid til at trænge ind i rødderne. Gentag behandlingen om nødvendigt, hvis ukrudtet groer igen næste år.

Kontrol af stubbes genvækst

Afskær den træagtige ukrudtsplante eller det unge træ over jordniveau, og påfør Roundup Gel Max på hele stubbens flade.

† 1 klik for en rod på 2-4 cm i diameter, flere klik for større træer.

Det bedste behandlingstidspunkt er sommer og efterår.

Eksempler på arter, der kan kontrolleres: Vedbend(efeu), fuglekirsebær, hyldetræ, asketræ og brombær.



112.0 mm

Verso.

68.0 mm

RESTRIKTIONER:

Undgå kontakt med planter der ønskes bevaret.

Vent med at betråde det behandlede område til Roundup Gel Max er tørt (dermed løverfører du ikke midlet til f.eks. græsplænen).

Regn indenfor de første 6 timer efter behandling kan reducere effekten, og igenbehandling kan være nødvendig.

† Hold børn og kæledyr udenfor det behandlede område, indtil Roundup Gel Max er tøret ind.

Brug gerne handsker. Undgå brug i nærheden af kloak og afløb.

FOR AT ÅBNE ROUNDUP® GEL MAX:

Tryk/klem på begge sider af det blå låg for at løfte hæften af.

Fjern folien.

Tryk/klem på den blå uldserknap for at frigive gelen.

Ved førstegangsbrug skal der trykkes på den blå uldserknap indtil gelen bliver synlig (op til 20 gange).

**SÅDAN BRUGES ROUNDUP GEL MAX:**

Bør eller stryg bladets overflade. Det er ikke nødvendigt at dække hele bladet. Læs nærmere under punktet "BRUGSANVISNING".

EFTER BRUG:

Efter brug afløses overskydende gelé fra den blå applikatoropt på et ukrudtsblad, før det blå låg påsættes forsvarligt.

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE:

Opbevares frostfrit.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

†(Om emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

112.0 mm

Recto.2

Recto.1