




MAKTESHIM
A G A N

SIMAZIN

500 SC

Må kun anvendes erhvervmæssigt til ukrudtsbekæmpelse i busketter, hække, frugtbuske og -træer, læhegn, i planteskoler og skovbrug samt til stikasparges

UKRUDTSMIDDEL



Deklaration: Ukrudtsmiddel, nr 396-10

Analyse: Simazin 500 g/l (43,9%)

Indeholder Ethylen glycol (6,5%)

Væske: nettoindhold **5 L**

Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

ADVARSEL

R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal overholdes ved udsprøjtningen, jf. leverandørbrugsanvisningen samt f.eks. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes erhvervmæssigt til ukrudtsbekæmpelse i busketter, hække, frugtbuske og -træer, læhegn, i planteskoler og skovbrug samt til stikasparges.

Produktet må kun anvendes om foråret indtil 15. maj, i planteskoler og stikasparges dog indtil 1. oktober.

Produktet må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandløb og søer.

Godkendelsesindehaver:

Makteshim - Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87,

NL-3832 GK Leusden, Holland

FØRSTEHJÆLP

Indånding : Bring vedkommende i frisk luft, søg læge ved fortsat ubehag

Hud : Foruren tøj fjernes og foruren hud vaskes med vand og sæbe.

Øjne : Skyl omgående med vand i flere minutter, og kontakt læge.

Indtagelse : Hos personer ved bevidsthed fremkaldes opkastning. Aktivt kul kan gives flere gang sammen med rigeligt vand.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Tom emballage skal uskadeliggøres som anført i brugsanvisningen.

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

KemiAgro
A.m.b.A.

Distributør:
KemiAgro A.m.b.A.
Centerhavnsvej 13
7000 FREDERICIA
Tlf.: 00 45 79212121
Fax: 00 45 79212159

UN 3082



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig

TT 265/A/07

SIMAZIN 500 SC

BRUGSANVISNING

Virkning

Simazin 500 SC er et ukrudtsmiddel med en bred virkning overfor de fleste ukrudtsarter, der spirer fra frø. Simazin 500 SC bliver liggende i de øverste 5-10 cm af jordlaget. Her optages det af ukrudtsplanternes rødder.

Simazin 500 SC bekæmper både to-kimbladet frøkrudt og en-kimbladet frøkrudt som enårige græsser. Men det bekæmper ikke kvik og andet etableret rodkrudt som f.eks. mælkebøtte, tidsel, padderokke og lignende. Endvidere er effekten på brandbæger utilstrækkelig. De første tegn på virkning er en gulfarvning af bladrandene efterfulgt af en visning af bladrande og bladspidser hvorefter planterne dør. På arealer med stort indhold af organisk materiale (højt humusindhold) nedsættes effekten.

Dosering	Liter pr. ha	
	Nyplantet 1.-2. år	Ældre beplantn. 3. år og ældre
Busketter og hække	0,5-1,0	1,5-2,0*
Frugttræer og frugtbuske	0,5-1,0	3,0-4,0
Læhegn	0,5-1,0	3,0-4,0*
Skovbrug, juletræer og pyntegrønt	1,0-2,0	3,0-4,0
Planteskolekulturer	0,5-1,0	-
Stikasparges	2,0-2,5	2,0-2,5

*) Ældre beplantninger af birk max. 1,0 l/ha
 Ældre beplantninger af liguster, potentil, snebær, syren og poppel max. 2,0 l/ha.

NB: de laveste doseringer anvendes på let jord.

Anvendelse

Simazin 500 SC anvendes bedst, når det udsprøjtes om foråret på fugtig jord og inden frøkrudtet spirer frem eller senest når det er på kimblad stadium.

I nyplantede kulturer skal jorden være faldet godt til om rødderne og planterne rodfæstet inden der behandles.

Stikasparges behandles senest 3 uger før stikning eller efter bedudjævning - kulturen må ikke være fremspiret.

Bemærk

Simazin 500 SC er et jordmiddel, der først og fremmest optages gennem ukrudtsplanternes rødder, men der er en risiko for, at kulturplanterne, under uheldige omstændigheder, kan optage Simazin 500 SC gennem bladene med skader til følge. Derfor anbefales det at udsprøjte Simazin 500 SC inden kultureernes knopper bryder eller som skærmet sprøjtning mellem kultureerne.

Sprøjteteknik

Hardidyser	Tryk	Liter pr. ha	
		150	200
Bredsprøjtning		Km/time	
ISO-F-02-110 Gul	3 atm	6,4	4,8
4110-14	3 atm	7,3	5,5

Simazin 500 SC kan også udbringes med rygsprøjte eller vandkande. Ved dosering til små arealer beregnes mængden af Simazin 500 SC således:

Liter pr.ha = ml pr. 10m²

(F.eks. læghegn: 3,0 l Simazin 500 SC pr. ha = 3,0 ml Simazin 500 SC pr. 10 m²)

Vandmængde: Rygsprøjte : 10 l vand rækker til
500 m²

Vandkande m. spredrerør : 10 l vand rækker til
maksimalt 80m²

Blandinger

Hvis etableret ukrudt skal bekæmpes, kan Simazin 500 SC blandes med Glyphosat. I så fald må kulturene ikke rammes - d.v.s. der skal sprøjtes afskærmet mellem planterne.

Opbevaring

Skal opbevares frostfrit.

Bortskaffelse

Tom emballage, rester og spild skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.