



# SPUD NIC



Godkendelsesindehaver:



Agriphar S.A.  
Rue de Renory, 26/1  
4102 Ougrée - Belgium



Distributør:

Nordisk Alkali  
Middelbovej 1  
8960 Randers SØ  
Tlf. 4649 1171/  
4649 1174  
[www.nordiskalkali.dk](http://www.nordiskalkali.dk)

Fremstillingsdato: Se på emballagen.  
Anvendes inden: 2 år fra fremstillingsdatoen.

**20 l**



Etikette nr.: I  
GODKENDT

- 7 SEP. 2009

for pakninger på:  
Miljøstyrelsen

20 liter

2708 SPUD NIC 20L DANEMARK: Mise en page 1 18/08/08 15:58 Page 1

#### Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til spirehæmning af oplagrede kartofler til industriel brug



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig

#### ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Brandfarlig.

Undgå indånding af aerosoltåger.

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.  
Må ikke tømmes i kloak afløb.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den lovlige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Vask alle personlige væmemidler efter brug.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Overtrædelse af følgende fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes til spirehæmning af oplagrede kartofler til industriel brug.**

**Må kun udbringes med Puls Fog i aflukkede opbevaringsrum.**

**Må ikke anvendes senere end 21 dage før forarbejdning af kartoflerne.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.**

**Opbevares utilgængeligt for børn.**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

Må ikke anvendes i højere doser end 20 ml pr 1000 kg kartofler pr gang og højst 3 gange. Det vil sige maximale dosering 60 ml pr 1000 kg kartofler. Må kun anvendes med Puls Fog i aflukkede opbevaringsrum. Må kun anvendes inden kartoflerne begynder at spire, men efter sårheling. Må kun anvendes som anført i brugsanvisningen.

#### Førstehjælp

Indånding : Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse : Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hudkontakt : Fjern forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand.

Øjenkontakt : Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 minutter. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser.

**Brugsanvisning**

SPUD NIC indeholder chlorpropham som virker spirehæmmende på kartofler. Behandlingen skal foretages inden kartoflemerne begynder at spire, men efter særhelingen. Behandlingen foretages med Puls-Fog.

**Fremgangsmåde**

Luk alle luftindtag og sæt ventilationen på intern cirkulation. Lad tågeapparatet tåge ind i luftstrømmen, som derved føres rundt i rummet. Lad apparatet arbejde indtil den forud fastsatte mængde er blæst ind. Lad derefter den interne cirkulation arbejde, indtil tågen er forsvundet (ca. 24 timer). Herefter kan ventilation ske efter de normale behov.

**Dosering:**

Som 1. gangs dosering: 20 ml pr 1000 kg kartofler.

Som 2. gangs dosering: 15 – 20 ml pr 1000 kg kartofler (2-3 måneder efter første behandling).

Som 3. gangs dosering: 15 – 20 ml pr 1000 kg kartofler (2 måneder efter anden behandling).

Maximal dosering: 60 ml pr 1000 kg kartofler.

**Værnemidler**

Brug handsker af nitrilgummi eller neopren, støvler, beskyttelsesdragt og høreværn.

Gå ikke ind i behandlede oplagsrum før efter 2 døgn, om nødvendigt skal de ovennævnte værnemidler anvendes, samt åndedrætsvæm med filter A2P2. Personale må ikke gå ind på lageret før friskluftventilationen har kørt nogle timer.

Ved håndtering af behandlede kartofler: Indenfor 2 uger efter behandling skal handsker anvendes.

Ved opbejring af jord fra behandlede kartofler bør der anvendes støvmaske.

**Opbevaring**

Opbevares i køligt, velventileret og frostfrit rum.

**Spild**

Inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnet beholder. Dette afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

**Bortskaffelse**

Rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovationen.

**Vækstreguleringsmiddel, nr. 361-10**

**Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.**

**Analyse: 500 g/l (49,8%) chlorpropham**

100 – 300 g/l (10 – 30%) isopropylalkohol