

STEREO

Svampemiddel

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i hvede, byg og rug.

DEKLARATION

Svampemiddel nr. 570-15

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

INDHOLD: 5 liter

ANALYSE: Cyprodinil 250 g/l (24%w/w)

Propiconazol 62,5 g/l (6% w/w)

Importør:



Herluf Trolles Vej 257
5220 Odense SØ
Tlf. 7020 4903

Etikette nr.: I
GODKENDT

- 4 NOV. 2003

for pakninger på: 5 liter
Miljøstyrelsen

Fabrikationsnummer:

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse (R65)

Irriterer huden og øjnene (R38/36)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43)

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Undgå indånding af aerosoltåger.

Undgå kontakt med huden

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen: Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler

Vask huden efter arbejdet

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i hvede, byg og rug.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i byg til modenhed ikke anvendes senere end 7 uger før høst.

Må i helsæd ikke anvendes senere end 5 uger før høst.

Må i hvede og rug ikke anvendes senere end 8 uger før høst.


Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb mm).

Opbevares utilgængeligt for børn

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Miljøfarlig



Sundhedsskadelig

BRUGSANVISNING

Anvendelse

Stereo er et meget effektivt svampemiddel mod svampesygdomme i byg, hvede og rug. Det bekæmper meldug, bygbladplet, bygrust, skoldplet, knækkefodssyge, gulrust, hvedegråplet, hvedebrunplet og brunrust. De anbefalede doseringer holder i op til 4 uger.

Dosering og anvendelsestidspunkt

I byg anvendes 1,6 liter/ha pr behandling. I hvede og rug anvendes 2,0 liter/ha pr behandling.

Der behandles så snart de første sygdomstegn viser sig i afgrøden.

Ved et splitdoseringsprogram bruges 0,4-0,8 l/ha i vår og vinterbyg. Dominerer meldug anvendes 0,8-1,0 l/ha eller iblandes et specifikt meldugmiddel.

Knækkefodssyge behandles med en dosering på 1,0-2,0 l/ha i stadium 30-32.

Vejrforhold

Der kan sprøjtes så snart temperaturen er over 6°C. Ved temperaturer over 25°C, bør sprøjtingen udsættes til efter kl 20.00 om aftenen. To timers tørvejrr er nok efter en sprøjting for at sikre en optimal effekt.

Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld sprøjten halvt med vand tilsæt Stereo under omrøring, derefter resten af vandet. Udsprøjtingen skal ske straks efter opblandingen.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Lagring

Lagres frostfrit i uåbnet emballage

Førstehjælp

Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

Indtagelse: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Hudkontakt: Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt: Skyl øjnene straks grundigt med vand. Gå til kontrol hos en øjenlæge.