



# TO CLOMAZON

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i  
kartofler, vinterraps, ærter og gulerod.

## DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 650-7

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om  
bekæmpelsesmidler

Analyse: Clomazon 360 g/l (34,8%)

Indeholder: Polymethylenpolyphenylisocyanat

Formulering: Flydende

Emballage:

# 1 liter

N



Miljøfarlig

Xn



Sundhedsskadelig

### ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

Undgå indånding af aerosoltåger. Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler, vinterraps, ærter og gulerod.

Må i kartofler kun anvendes efter lægning og ikke senere end 5 dage før fremspiring. Må i vinterraps kun anvendes efter såning og ikke senere end 3 dage efter. Må i ærter og gulerødder ikke anvendes senere end 60 dage før høst. Efter dyrkning af kartofler, ærter og gulerødder må der ikke plantes/sås kortvarige efterfølgende afgrøder i samme vækstsæson. Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn. Emballagen må ikke genanvendes.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

### Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde	Skadegører	Dosis	Tidspunkt
Vinterraps	Burresnærre, hyrdetaske, fuglegræs, tvetand.	0,25 - 0,33 liter/ha	Lige efter såning og senest 3 dage efter. Laveste dosering på let jord
Kartofler	Tokimbladet ukrudt samt enårig rapgræs	0,2 liter/ha	Umiddelbart efter lægning og færdighypning af kartoflerne. Senest 5 dage før gennembrudning
Gulerod, ærter	Frøukrudt	0,25 liter/ha	Anvendes lige efter såning og ikke senere end 5-10 dage før fremspiring

**Vinterraps:** TO Clomazon udsprøjt direkte på jordoverfladen senest 3 dage efter såning. Et veltillavet såbed uden knolde og med god jordfugtighed fremmer effekten. Rapsen sås i mindst 2 cm dybde og frøene skal være dækket af jord. Rapsen må ikke være spiret frem på sprøjtetidspunktet.

**Kartofler:** Sprøjtøvæsken fordeles jævnt over kammen, effekten er bedst når kammen har fået tid til at sætte sig. Kartoflerne skal være dækket, så kontakt mellem sprøjtøvæske og kartofler undgås. Der bør ikke foretages jordbehandling efter sprøjtningen.

**Gulerod, ærter:** Udsprøjt direkte på jordoverfladen. Et veltillavet såbed uden knolde og med god jordfugtighed fremmer effekten. Brug ikke produktet på humusjorde da effekten er nedsat.

**Forholdsregler ved efterfølgende afgrøder og omsåning efter udvintring:** Efter dyrkning af kartofler, ærter og gulerødder må der ikke plantes/sås kortvarige efterfølgende afgrøder i samme vækstsæson. Ved udvintring af vinterraps behandlet med TO Clomazon kan der om foråret efter en grundig pløjning sås om med korn, ærter, majs, kartofler, vårraps, gulerødder, løg og hør

**Sprøjteteknik:** Det er vigtigt, at sprøjtedyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 150 til 250 liter per hektar. Hvor der er risiko for afdrift til arealer, hvor der skal sås folsomme afgrøder anvendes low-drift dyser.

Dyse	Bar	Km/time	l/ha
ISO-F-02-110 Gul	3	6,4	150
ISO-F-025-110 Lilla	3	6,1	200
ISO-F-03-110 Blå	3	5,7	250

**Tilberedning af sprøjtøvæske:** Inden sprøjtningen fyldes skal den være omhyggelig rengjort. Fyld ¾ af tanken med vand og tilsæt TO Clomazon under omrøring, tilsæt derefter resten af vandet. Der skal være konstant omrøring under blanding og sprøjtning. Blandingen udsprøjt straks efter blanding. Blandes produktet med andre midler skal de først påfyldes sprøjten og derefter TO Clomazon. **Optimale virkningsforhold:** Bedst effekt opnås ved sprøjtning ved en god jordfugtighed.

**Rengøring af sprøjtemateriel:** Sprøjten tømmes helt for sprøjtøvæske i marken. Sprøjten skylles grundigt med rent vand. Skyllenvandet udsprøjt på et allerede behandlet areal. Fyld 100-200 liter vand i sprøjten og tilsæt et egnet rensmiddel. Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter skyllenvandet ud på et allerede behandlet areal.

Skyll efter med rent vand, som udsprøjt på det allerede behandlede areal. **Lagring:** TO Clomazon skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

**Bortskaffelse af tom emballage:** Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovation. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllenvandet hældes op i sprøjtøvæsken.

**Bemærk:** Agros fralægger sig alt ansvar for produktets effekt herunder skader og følgeskader som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssigt brug eller opbevaring.

Vejrtilg, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

Registreringsindehaver: Agros, Jernbanegade 27, 6000 Kolding  
tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk