



# TO EPOXICONAZOL

Svampemiddel

Må kun anvendes til svampebekæmpelse  
i korn og bederoer

## DEKLARATION

Svampemiddel nr.: 650-2  
Aktivstof: Epoxiconazol  
Koncentration: 125 g/l (12,1 %)  
Formulering: Flydende

Emballage:

# 5 liter

### ADVARSEL

**For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.**

R 40: Mulighed for kræftfremkaldende effekt. R62: Mulighed for skade på forplantningsevnen. R 63: Mulighed for skade på barnet under graviditeten. R51/53: Giftigt for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Undgå indånding af aerosoltåger. Brug særligt arbejdstøj. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og bederoer.**

**Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Må i korn ikke anvendes senere end 5 uger før høst.**

**Må i bederoer ikke anvendes senere end 4 uger før høst.**

**Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (søer og vandløb mm.)**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand / Undgå forurening via dræn fra gårdspadser og veje.**

**Opbevares utilgængeligt for børn.**

N



Miljøfarlig

Xn



Sundhedsskadelig

### Førstehjælp:

**Generelle anvisninger:** Aftag forurenede tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

**Indånding:** Ro, frisk luft og lægehjælp.

**Hudkontakt:** Vask grundigt med vand og sæbe.

**Øjenkontakt:** Fjern kontaktlinser. Spil øjet op og skyl grundigt med vand.

**Indtagelse:** Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

**Til lægen:** Ingen specifik modgift kendes.

# Brugsanvisning To Epoxiconazol

## Generelt

Epoxiconazol optages hurtigt af planten. Der ses normalt ikke svidninger i afgrøden, sprøjt dog ikke i meget varmt vejr.

### Afgrøder, skadegørere, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde	Tidspunkt	Skadegører	Dosis
Hvede	Stadie 30-71	Gulrust, Brunrust, Hvedebrunplet, Hvedegråplet	0,5 – 1,0 liter/ha
Byg	Stadie 30-59	Bygrust, Bygbladplet, Skoldplet	0,5 – 1,0 liter/ha
Rug	Stadie 30	Brunrust, Skoldplet,	0,5 – 1,0 liter/ha
Triticale	Stadie 30	Brunrust, Skoldplet, Hvedebrunplet, Hvedegråplet	0,5 – 1,0 liter/ha
Havre	Stadie 30	Kronrust Havrebladplet	0,5 – 1,0 liter/ha
Bederøer	Stadie 45-49	Ramularia, bedemeldug, bederust	0,5 – 1,0 liter/ha

Det anbefales at bruge 1 liter pr ha. Denne dosering forventes at give en effekt, som varer ca. 4 uger.

I blanding med et strobilurin reduceres doseringen til en 0,5 liter, så den samlede dosering udgør 1 normaldosering. Ved split sprøjtning reduceres doseringen.

Sprøjteteknik			
Dyse	Bar	Km/time	l/ha
ISO-F-02-110 Gul	3	6,4	150
ISO-F-025-110 Lilla	3	6,1	200
ISO-F-03-110 Blå	3	6,7	250

### Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 150 til 250 liter pr ha

### Tankblanding

TO Epoxiconazol kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid blandingspartners brugsanvisning nøje.

### Rengøring af sprøjtemateriel

Sprøjtet tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

Sprøjtet skylles grundigt med rent vand. Skyllevandet udsprøjtes på et allerede behandlet areal. Fyld 100-200 liter vand i sprøjtet og

tilsæt et egnet rensmiddel. Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter skyllevandet ud på et allerede behandlet areal. Skyl efter med rent vand, som udsprøjtes på det allerede behandlede areal.

### Lagring

TO Epoxiconazol skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

### Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæskens. Emballagen må ikke genanvendes.

### Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.