

TALISMA EC

Etiketne nr: |
GODKENDT

10. juni 2016

for pakninger på
Miljøstyrelsen 1L

INSEKTMIDDEL

Må kun anvendes
til bekæmpelse af
kornskadedyr i lagret korn
samt i tomme kornlagre.

Dette
plantebeskyttelsesmiddel
må kun købes af
professionelle og anvendes
erhvervsmæssigt og kræver
gyldig autorisation.

Deklaration

Insektmiddel nr. 361-46
Omfattet af Miljøministeriets
bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
og plantebeskyttelsesmiddelforordningen
1107/2009.

Indeholder:

Cypermethrin 80 g/L (7,89 % w/w) ved 20°C
Midlet er emulgerbart koncentrat.

Godkendelsesindehaver:

Arysta LifeScience Benelux SPRL
Rue de Renory 26
B-4102 Ougrée
Belgium

Tlf.: 00 32 43 85 97 11

Distributør:

Tanaco a Pelsis Group Company
Glentevej 11
DK-6705 Esbjerg Ø
www.tanaco.com
Tlf: 75 14 48 00

Udløbsdato og batchnr: se emballagen
Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt
og godt ventileret sted. Må ikke udsættes for frost



Nettoindhold: 1 L

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers
sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Farligt ved indtagelse (H302).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende
organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette
produkt (P270).

Undgå udledning til miljøet (P273).

Bær beskyttelseshandsker (P280).

Udslip opsamlles (P391)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med
og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det
eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan
medføre straf:

**Må kun anvendes til bekæmpelse af kornskadedyr
i lagret korn samt i tomme kornlagre.**

**Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere
doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt
produktet (SP1).**

Må ikke tømmes i kloakfløb.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

ITILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION eller læge (P301+P312).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe (P302+P352).

Ved hudirritation eller udslett: Søg lægehjælp (P333+P313).

Alt tilmudset tog tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

BRUGSANVISNING

VIGTIGT: Denne information er godkendt som en del af produktets etiket og skal læses grundigt for at
opnå en sikker og effektiv anvendelse af produktet.

TALISMA EC er et flydende beskyttelsesmiddel til bekæmpelse af en lang række kornskadedyr bl.a.
kornkapuciner, korn- og rissnudebille, rismelbille, fransk kornmøl og tofarvet frømol.

Dosering

KORNBLANDING: Fortynd TALISMA EC med vand og påfør det på det høstede korn, for dette oplagres,
ved hjælp af sprøjteudstyr. For at opnå optimal effektivitet skal dysen placeres nederst eller øverst
på elevatortransportbåndet, på et transportbånd (undgå direkte kontakt med selve transportbåndet)
eller, hvor kornene lander.

Doseringen afhænger af anvendelsen og beskyttelsesperioden i henhold til nedenstående tabel:

AFGRØDER	ANVENDELSE	BESKYTTELSESPERIODE	DOSERING
Oplagrede kornprodukter	Forebyggende	Op til 6 måneder	1 L TALISMA EC fortyndet i 99 L vand pr. 100 tons korn
	Bekæmpende	Op til 3 måneder	2 L TALISMA EC fortyndet i 98 L vand pr. 100 tons korn.



Maksimal antal behandlinger: 1 pr. batch/parti.

Alle former for korn, der er behandlet med TALISMA EC, kan forarbejdes umiddelbart
efter.
BRUG IKKE BEHANDLET KORN TIL SÅNING.

KORNLAGER: Når kornlageret er tomt for høsten, skal gammelt korn, støv og
andet snavs fjernes, og kornhåndteringsudstyret skal rengøres grundigt. Sprøjt
på alle overflader i det tomme kornlager og på kornhåndteringsudstyret og sørg
for, at opløsningen kommer ind i alle sprækker. **Tomme og rengjorte lagre skal
behandles 3-4 uger, før nyt korn fyldes ind.**

Doseringen foretages i henhold til nedenstående tabel:

BEHANDLING	BESKYTTELSESPERIODE	DOSERING
Poros overflader (absorberende)	Op til 3 måneder	0,06 L TALISMA EC fortyndet i 5 L vand pr. 100 m ²
Ikke-poros overflader (ikke-absorberende).	Op til 3 måneder	0,03 L TALISMA EC fortyndet i 5 L vand pr. 100 m ²

Maksimal antal behandlinger: 1 pr. år

Værnemidler

Bær passende beskyttelsestøj (overtræksdragt) og passende beskyttelseshandsker
ved håndtering af produktet eller kontaminerede overflader. Se nærmere i
Sikkerhedsdatabladet.

Resistens

Cypermethrin er en pyrethroide fra IRAC-gruppe 3A. For at minimere risikoen
for resistens, brug insekticider fra forskellige kemiske klasser og med forskellige
virkemåder i løbet af sæsonen.

Rengøring af sprøjteudstyr

Sprøjteudstyr og værktøj skylles 3 gange med vand. Skyllvandet hældes op i
sprøjtevesken. Se Miljøstyrelsen vejledning om påfyldning og vask af sprøjter til
udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1752 af
14. december 2015.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler
for affaldshåndtering. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme
beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllvandet hældes op i sprøjtevesken.
Emballagen må ikke genbruges.

VIGTIGT: Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt
skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig
opbevaring og/eller anvendelse af produktet.