

# Tanaco Koncentreret Ukrudtsmiddel 360

**Ukrudtsmiddel**

**Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt til nedvisning af græsplæner.**

## DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr. 582-2

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

**INDHOLD:** 0,5 liter

**ANALYSE:** Glyfosat 360 g/l ( Vægt 30 % )

Registreringsindehaver:

Cab-Dan ApS

Mådevej 80

6705 Esbjerg Ø

## ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Irriterer huden og øjnene (R36/38)

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).

Brug egnede beskyttelseshandsker under opblanding

Vask huden efter arbejdet

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt til nedvisning af græsplæner.**

**Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.**

**Må ikke udbringes med vandkande.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**


**Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer mv).**

**Opbevares utilgængeligt for børn**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**



Skal fylde 10% af advarselsfeltet



Skal fylde 10% af advarselsfeltet

**Faresymbol Xi lokalirriterende**

**Faresymbol N Miljøfarlig**

## BRUGSANVISNING

### Brugsanvisning

Tanaco Koncentreret Ukrudtsmiddel360 bruges til bekæmpelse af uønsket plantevækst.

Det kan anvendes fra om foråret når væksten begynder og indtil om efteråret når væksten standser. Bedste effekt opnås i tørvejr og med planterne i god vækst. Der kan gå op til 3 uger før nedvisningen er komplet. **Generelt pas på vinddrift, det kan ofte være**

**nødvendigt at foretage en afskærmet sprøjtning.**



## Dosering

Brug 10 ml pr 1 liter vand og det kan række til 15-20 m<sup>2</sup>. Brug et målebæger til at afmåle mængden med nøjagtigt.

## Udbringning

Tanaco Koncentreret Ukrudtsmiddel 360 udbringes med en havesprøjte eller en sprayflaske.

## Udyrkede arealer, under træer og buske

Ved behandling under buske og træer er det ofte nødvendigt at behandle selektivt, da sprøjtning på eventuelle rodkud kan skade moderplanten.

## Arealer med belægninger

På arealer med belægninger af sand, grus, fliser, sten o. lign. må der kun sprøjtes på ukrudtet. Undgå at ramme arealet uden om ukrudtet.

## Nedvisning af græsplæner

Nedvisning af gamle græsplæner kan foretages med omtalte dosering. Arealet kan bearbejdes og tilsås 1-2 uger efter sprøjtning.

## Selektiv behandling

Tanaco Koncentreret Ukrudtsmiddel 360 kan anvendes til udpensling på uønsket plantevækst. Det er en mere sikker måde at behandle på. Fortynd produktet med 6 gange vand.

## Stødbehandling

Genvækst og rodkud fra fældede træer og buske kan undgås ved at pensle stubbens snitflade med fortyndet Tanaco Koncentreret Ukrudtsmiddel 360. Behandlingen foretages umiddelbart efter fældning. Ved rodsammenvoksninger kan nabotræer skades betydeligt. Bedste effekt opnås fra oktober til marts.

## Rengøring af sprøjten.

Sprøjten vaskes grundigt med vand efter brugen. Skylle vandet bruges på det behandlede areal.

## Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

## Førstehjælp

**Indånding:** Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

**Indtagelse:** Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

**Hudkontakt:** Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.

**Øjenkontakt:** Kommer midlet i øjnene, skylles straks grundigt med vand.