

Tanaco Plænerens

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i etablerede græsarealer som f.eks. græsplæner, sportsanlæg og golfbaner.

KONCENTRAT

Etikette nr.: II
GODKENDT

22 JAN. 2013

for pakninger på
Miljøstyrelsen

1L, 5L
og 500ml

1 liter

ADVARSEL:

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisning følges nøje.

Meget giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53). Brug beskyttelsesdragt med hætte ved traktor udsprøjtning/ opblanding. Brug egnede beskyttelsehandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Emballagen må ikke genbruges.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

- **Må kun anvendes til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i etablerede græsarealer som f.eks. græsplæner, sportsanlæg og golfbaner.**
- **Må ikke anvendes på græsarealer, der bruges til afgræsning.**
- **Må kun anvendes én gang om året og ikke senere end 1. oktober.**
- **Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**
- **Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer der lever i vand.**
- **Undgå at forurene vandmiljøet med produkter eller med beholdere, der har indeholdt produktet.**
Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.
- **Må ikke tømmes i kloak afløb.**
- **Opbevares utilgængeligt for børn.**
- **Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

Hvornår Tanaco Plænerens anvendes i vækstsæsonen.

jan	feb	mar	apr	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
			X	X	X	X	X	X	X		

Virkemåde: Tanaco Plænerens optages gennem bladene og hvorefter det transporteres med saftstrømmen rundt i planten. Ukrudtsplanterne vil visne i løbet af 2-3 uger afhængig af vækstbetingelserne i perioden.

Dosering: Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen.

Håndsprøjte: 100 ml Plænerens til 5 liter vand, som vil række til ca. 100 m²

Marksprøjte: Vandmængder fra 150 til 200 liter per hektar med en dosering på 10 liter Plænerens/ha.

Begrænsninger:

Behandlet græs må ikke anvendes som dyrefoder. Tanaco Plænerens må ikke anvendes hvor klørevækst ønskes. Undgå at sprøjte i kraftig vind for at undgå vinddrift af midlet. Behandl ikke nysået græs i etableringsfasen. Må anvendes 1 gang årligt og ikke efter 1. oktober.

Lagring: Tanaco Plænerens skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Bortskaffelse af tom emballage: Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllenvandet hældes op i sprøjtevæskan.

Rensning af sprøjteudstyr: Sørg for at rense sprøjten grundigt efter anvendelse.

Anvend 10 ml ammoniak (salmiakspiritus) pr. liter vand. Skyl også slange og dysser.

Udsprøjt skyllevandet på det areal, som lige er blevet behandlet.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjtemidler til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009.

Brugsanvisning:

Tanaco Plænerens anvendes direkte på de etablerede græsplæner mod bredbladet ukrudt, f.eks. tidsler, mælkebøtter, fuglegræs, vejbred, bellis, hønsetarm, kløver, pileurt, ranunkel, røllike, vejbred, ærenpris, borst, brunelle, kongepen mv.

Tanaco Plænerens kan anvendes i hele vækstperioden, men med bedst virkning, når græs og ukrudt er i god vækst. Det vil sige ved høj luftfugtighed og ved temperaturer over 8°C. Sprøjt/behandel når græsset er tørt.

Tanaco Plænerens bør ikke udsprøjttes i forbindelse med nattefrost eller med udsigt til regn inden for 6 timer.

Det kan ikke anbefales, at behandle tørkestresset græs.

Græsset bør ikke klippes 3-5 dage før og efter behandlingen.

Skader ikke græsset. Nyanlagte plæner behandles tidligst efter 4-6 måneder.

Førstehjælp: Generelt: Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud og øjne søges straks læge.

Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft (undgå afkøling).

Huden: Fjern gennemvædet tøj. Kommer stoffet på huden vaskes med vand og sæbe.

Øjnene: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Fremkald ikke opkastninger. Kontakt omgævede læge og vis denne beholder eller etiket.

Deklaration

Ukrudtsmiddel nr.: 361-19

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009



Miljøfarlig

Analyse:

MCPA 70 g/l (7% w/w ved 20°C)
MCPP-P 42 g/l (4,2% w/w ved 20°C)
Dicamba 20 g/l (2% w/w ved 20°C)
2,4-D 70 g/l (7% w/w ved 20°C)

Midlet indeholder 2,4-D;
Kan udløse allergisk reaktion

Type: Flydende

Indhold: 1 liter

Batch nr.: Se bund

Udløbsdato: Se bund

Godkendelsesindehaver:

Agriphar S.A.
Rye de Renory 26/1
B-4102 Ougree
Belgium

Forhandler:

Tanaco A/S, Glentevej 11
DK-6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 75 14 48 00 - www.tanaco.dk



TA3228-3DK