

TOMIGAN 180

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr. 570-39

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Indhold: **5 liter**

Analyse: 180 g/l iter fluoxypyr (18% w/w)

Indeholder solventnaphtha (råolie) tung aromatisk

Registreringsindehaver:

3A-Kemi

Silkeborgvej 25

8464 Galten

Tel. 86943011

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse (R65)

Irriterer øjnene og huden (R36/38)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43)

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed (R67)

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uer skede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53)

Undgå indånding af aerosoltåger.

Undgå kontakt med huden


Brug egnede beskyttelsesudrustninger under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for

anvendelsen: Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpe sesmidler

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

■ **Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs.** ■ **Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.** ■ **Må i korn ikke anvendes senere end 2 måneder før høst.** ■ **Grønkorn af vårsæd må høstes fra skridning og af vintersæd fra 1 uge efter skridning.** ■ **Behandlede arealer må ikke afgræsses før 14. dag efter behandling.** ■ **Må i fodermajs ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.** ■ **Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet, vandløb, søer m.v. for at beskytte organismer, der lever i vand.** ■ **Undgår at forurene vandmiljøet med produkter eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.** ■ **Opbevares utillgængeligt for børn** ■ **Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**



Miljøfarlig



Sundhedsskadelig

BRUGSANVISNING

Anvendelse

Tomigan 180 er velegnet til bekæmpelse af burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, hanekro, vejpileurt og snerlepileurt i korn. Desuden opnås en god bekæmpelse af ager-snerle, haremad, jordrøg, nælde, pengeurt, skræppe og tvetand, når ukrudtet har 2 - 4 blade. Tomigan 180 optages primært gennem bladene. På følsomme ukrudtsarter vil man normalt kunne se en virkning 1 - 2 dage efter behandling. Væksten vil standse, og planterne vil visne bort i løbet af 3 - 4 uger.

Klimaforhold

Bedste effekt af Tomigan 180 opnås når ukrudtsplanterne er i god vækst, hvilket betyder en temperatur på over 7-8 °C. Ved lavere temperatur kan effekten på ukrudtet blive for svag.

Tomigan 180 er relativt uafhængig af luftigheden, det vil sige, at man har samme sikre effekt midt på dagen, som ved en morgensprøjtning.

Det frarådes at sprøjte, når ukrudtet er under stress pga. tørke, vandlidende jord, meget høj dagtemperatur, samt hvis der er udsigt til en periode med frost omkring behandlingstidspunktet. 1 times tørvej efter sprøjtning er nok til at sikre effekten.

Dosering

Afgrøde	Skadegørere	Dosering	Tidspunkt
Vårsæd	Burresnerre, hanekro, forglemmigej, haremad, fuglegræs, snerlepileurt, tvetand, vejpileurt	0,60 - 0,80 l/ha	April - maj
Vintersæd/vår	Burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, snerlepileurt, tvetand, vejpileurt	0,70 - 0,80 l/ha	April - maj
Fodermajs	Burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, mækebøtte, nælde, skræppe, snerlepileurt, tvetand, vejpileurt	0,60 - 1,50 l/ha	Maj - juni
Græsarealer	Burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, mækebøtte, nælde, skræppe, snerlepileurt, tvetand, vejpileurt	1,50 - 2,00 l/ha	April - maj

Blandinger

Tomigan 180 kan normalt blandes med de mest anvendte svampemidler, insektmidler og stråforkortningsmidler. Husk altid at læse etiketten på blandingspartneren. Overhold anførte doseringsvejledninger og begrænsninger. Det frarådes at tankblende med flyvehævemidler og flydende kvælstofgødninger.

Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld tanken halvt op med rent vand. Tilsæt Tomigan 180 og fyld resten af vandet i, og tilsæt eventuelt klæbemiddel hvis blandingspartneren kræver det. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen.

Halm og plantemateriale

Bør ikke anvendes i drivhuse eller til kompost.

Vinddrift

Pas på vinddrift da det kan skade følsomme afgrøder, såsom kartofler.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 100 til 300 liter per hektar.

ISO - Alm fladsprededyser ved 3 bar tryk og 6 km/t

Dysetørrelse	Ydelse (l/ minut)	Væskemængde l/ha
02	0,8	160
025	1,0	200
03	1,2	240

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelsen. Skyllevandet hældes op i sprøjte-væskan.

Rengøring

Sprøjten rengøres først grundigt efter sprøjtningen med rent vand. Vaskevandet udsprøjtes på allerede behandlede arealer. Fyld sprøjten med vand og tilsæt et egnet rensmiddel til næste hold skyllevand (0,3 l salmiakspiritus pr 100 l vand eller All Clear Extra 0,5 liter pr 100 l vand) lad væsken stå i sprøjten i 15 minutter og sprøjt det derefter ud på et egnet areal. Behandlingen gentages hvis nødvendigt. Husk at rense slanger og dyser grundigt.

Førstehjælp

Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

Indtagelse: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Etiket nr.: J
GODKENDT

08 MAJ 2008

for pakninger på 5 Liter
Miljøstyrelsen