

Trimmer® 50 SG

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af frøgræs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Analyse:

tribenuron-methyl 500 g/kg (50% w/w)

Formulering:

midlet er et vandopløseligt granulat

Ukrudtsmiddel: nr. 3-184

Virkemåde: HRAC B

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Holdbarhed: produktet er holdbart til mindst 2 år efter fabriktionsdato.

Registreringsindehaver:

DuPont Danmark ApS

Langebrogade 1,

DK-1411 København K,

Tlf. 32 66 20 00,

www.dupontagro.dk

Importør/Distributør:

ADAMA Northern Europe B.V.

Arnhemseweg 87

NL-3832 GK Leusden

The Netherlands

www.adama.com

* ADAMA Agan Ltd.

100 g e



Scan for brug



UN 3077



DENMARK

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Bær beskyttelseshandsker (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af frøgræs. ●

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. ● Må i korn samt korn med

udlæg af frøgræs ikke anvendes senere end 6 uger før høst, for helsæd dog ikke senere

end 4 uger før høst. ● Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Den maksimale dosis i

vårafgrøder i vækststadiet 12-27 er 10,0 g Trimmer 50 SG/ha og i vækststadiet 28 er den 15,0 g Trimmer 50 SG/ha.

For vinterafgrøder er den maksimale dosis om efteråret 7,5 g Trimmer 50 SG/ha i vækststadier over 11. Om foråret

er den maksimale dosis 13,5 g Trimmer 50 SG/ha i vækststadiet 12-29 og 15,0 g Trimmer 50 SG/ha i vækststadiet 30.

● For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må

endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron,

metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl. ● Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet

(vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). ● Undgå forurening af vandmiljøet med

produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). ●

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). ● Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



ANETRMMSGDK100G/02/A

Fabrikationsnr.:/
Fabrikationsdato:

Trimmer® 50 SG

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af frøgræs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Analyse:

tribenuron-methyl 500 g/kg (50% w/w)

Formulering:

midlet er et vandopløseligt granulat

Ukrudtsmiddel: nr. 3-184

Virkemåde: HRAC B

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Holdbarhed: produktet er holdbart til mindst 2 år efter fabriktionsdato.

Registreringsindehaver:

DuPont Danmark ApS
Langebrogade 1,
DK-1411 København K,
Tlf. 32 66 20 00,
www.dupontagro.dk

Importør/Distributør:

ADAMA Northern Europe B.V.
Arnhemseweg 87
NL-3832 GK Leusden
The Netherlands
www.adama.com

© ADAMA Agan Ltd.

100 g e



Scan for brug



UN 3077



DENMARK

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Bær beskyttelsehandsker (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af frøgræs. ●

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. ● Må i korn samt korn med

udlæg af frøgræs ikke anvendes senere end 6 uger før høst, for helsæd dog ikke senere

end 4 uger før høst. ● Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Den maksimale dosis i

vårafgrøder i vækststadiet 12-27 er 10,0 g Trimmer 50 SG/ha og i vækststadiet 28 er den 15,0 g Trimmer 50 SG/ha.

For vinterafgrøder er den maksimale dosis om efteråret 7,5 g Trimmer 50 SG/ha i vækststadier over 11. Om foråret

er den maksimale dosis 13,5 g Trimmer 50 SG/ha i vækststadiet 12-29 og 15,0 g Trimmer 50 SG/ha i vækststadiet 30.

● For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må

endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron,

metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl. ● Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet

(vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). ● Undgå forurening af vandmiljøet med

produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). ●

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). ● Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



ANETRMMSGDK100G/02/A

Fabrikationsnr.:/
Fabrikationsdato:

Trimmer® 50 SG Ukrudtsmiddel

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).
Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt.

Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg læge.

Nødtelefon: +46 (0)8 337043 eller Giftlinjen (Bispebjerg hospital) 82121212

BRUGSANVISNING

Opbevares tørt og køligt i tæt lukket emballage.

GENEREL INFORMATION

Trimmer® 50 SG er et bredtvirkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i korn med eller uden udlæg af frøgræs.

Frøgræsarter: Alm. og italiensk rajgræs, rødsvingel, engrapgræs og hundegræs.

Trimmer® 50 SG optages hurtigt gennem bladene. Selv om der går 1-3 uger, før der er synlig effekt på ukrudtet i form af gule/sorte, senere døde hjertesked, er væksten standset på få timer.

Trimmer® 50 SG virker ved lave temperaturer (fra 4 - 6°C), hvis ukrudtet er i aktiv vækst. Regn få timer efter udsprøjtning påvirker ikke effekten, hvis sprøjtevæsken er tørret ind på planterne.

Undgå altid vinddrift til læhegn, naboafgrøder eller marker, hvor der skal dyrkes andet end korn.

BEGRÆNSNING I ANVENDELSEN OG EFTERFØLGENDE AFGRØDER

Trimmer® 50 SG er godkendt til ukrudtsbekæmpelse i korn i en maksimal dosering på 15 g per hektar om foråret og 7,5 g per hektar om efteråret, (se yderligere om maksimale doseringer under brugsanvisning).

I korn med udlæg af frøgræsserne; rødsvingel, engrapgræs, almindelig/italiensk rajgræs og hundegræs må der maksimalt anvendes 7,5 g Trimmer® 50 SG per hektar i udlægsåret samt lige efter høst af dæksæden.

I korn med udlæg af græs til foder og grønne marker må der maksimalt anvendes 15 g per hektar i udlægsåret.

Om efteråret efter behandling med Trimmer® 50 SG kan der sås korn, evt. med udlæg, og vinterraps. Der bør ikke plantes/sås specialafgrøder (f.eks. roser), hvis der er brugt Trimmer® 50 SG om foråret.

Om foråret året efter en behandling med Trimmer® 50 SG er der ingen begrænsninger i, hvad der kan plantes/sås.

Der ikke må anvendes produkter indeholdende tribenuronmethyl, metsulfuron-methyl, iodosulfuron, triasulfuron eller thifensulfuron i samme vækstår, som Trimmer® 50 SG anvendes.

OMSÅNING AF ET TRIMMER® 50 SG BEHANDLET AREAL

I tilfælde af omsåning om foråret af et efterårsbehandlet areal, kan der dyrkes korn evt. med græs/kløvergræsudlæg, hør, raps, hestebønner, ærter og kartofler.

Hvis et forårsbehandlet areal skal omsås, kan der kun sås korn samme forår.

Til ukrudtsbekæmpelse på omsåede arealer, må der ikke anvendes Trimmer® 50 SG eller et andet produkt fra samme virkemåde: Virkemådeklasse B.

VIRKNINGSSPEKTRUM

Når brugsanvisningen følges, har Trimmer® 50 SG effektiv virkning på de fleste 2-kimbladede ukrudtsarter i korn. Sen sprøjtning, indtil begyndende blomsterknopdannelse, giver stadig god effekt på arter nævnt under "Effektiv virkning".

Effekt ved fuld dosis Trimmer® 50 SG pr. ha + klæbemiddel:

Agersennep	Haremad	Alm pengeurt
Agertidsele*	Hvidmelet gåsefod	Aften-pragtstjerne
Bleg pileurt	Hyrdetaske	Kruset skræppe
Fersken-pileurt	Lugtløs kamille	Alm. spergel
Mark-forglemmigej	Skive-kamille	Spildraps
Alm. Fuglegræs	Krumhals	Svinemælk*
Gulurt (Amsinckia)	Nat-limurt	Korn-valmue
Hanekro		

God virkning (hvis bekæmpelse sker på kimbladstadiet):

Kornblomst	Rød tvetand	Vej-pileurt
Mælkebøtte	Snerle-pileurt	

Svag virkning:

Agerstedmoder	Liden nælde	Sort natskygge
Burresnerre	Læge-jordrøg	Storkronet ærenpris

Gul okseøje

* Frøfremspirede planter.

Brugsanvisning

Der må kun anvendes Trimmer® 50 SG én gang i vækstsæsonen.

Maksimaldosering i forhold til kornets vækststadier:

For at sikre, at den mængde Trimmer® 50 SG der rammer jorden overholder kravene til godkendelsen, tilpasses den maksimalt tilladte dosering efter afgrødens vækststadie.

Afgrøde	Årstid, kornets vækststadie	Maksimal dosering per hekta
Vintersæd, inkl. med udlæg til foder og grønne marker	Efterår, BBCH >11	7,5 g Trimmer® 50 SG
	Forår, BBCH 12 - 29	13,5 g Trimmer® 50 SG
	Forår, BBCH > 30	15,0 g Trimmer® 50 SG
Vårsæd, inkl. med udlæg til foder og grønne marker	BBCH 12-27	10,0 g Trimmer® 50 SG
	BBCH > 28	15,0 g Trimmer® 50 SG
Korn med udlæg af frøgræs	Udlæg 2-3 blade	7,5 g Trimmer® 50 SG

Afgrøde	Årstid, kornets vækststadie	Maksimal dosering per hekta
Frøgræs efter høst	Efterår	7,5 g Trimmer® 50 SG
Rajgræs udlagt i renbestand efter høst	Efterår, udlæg 2-3 blade	7,5 g Trimmer® 50 SG

VINTERSÆD (uden udlæg)

Efterår, fra stadie 11: Alm. fuglegræs, kamille, markforglemmevej, hyrdetaske, spildraps, korn-valmue og andre overvintrende ukrudtsarter. Behandling foretages når ukrudtet har ca. 2 blade.

Dosering: 7,5 g Trimmer® 50 SG pr. ha + spredemiddel.

Efter en efterårsbehandling med ovennævnte dosering vil der ofte være behov for en opfølgende ukrudtssprøjtning om foråret med et passende middel/dosering.

Forår, stadie 12 - 29: Alm. fuglegræs, kamille, markforglemmevej, spildraps, hyrdetaske, korn-valmue og andre ifølge virkningsspektrum. Behandling foretages tidligt forår, efter væksten er begyndt.

Dosering: 13,5 g Trimmer® 50 SG pr. ha + spredemiddel.

Forår, stadie > 30: Alm. fuglegræs, kamille, markforglemmigej, spildraps, hyrdetaske, korn-valmue og andre ifølge virkningsspektrum. Behandling foretages når efter væksten er begyndt.

Dosering: 15 g Trimmer® 50 SG pr. ha + spredemiddel.

VÅRSÆD (uden udlæg)

Stadie 12-27: Agersennep, bleg pileurt, fersken-pileurt, alm. fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, spildraps og andre ifølge virkningsspektrum. Behandling foretages på ukrudtets 2-4 bladstadium.

Dosering: 10 g Trimmer® 50 SG pr. ha + spredemiddel.

Stadie > 28: Agersennep, bleg pileurt, fersken-pileurt, alm. fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, spildraps og andre ifølge virkningsspektrum. Behandling foretages på ukrudtets 2-4 bladstadium.

Dosering: 15 g Trimmer® 50 SG pr. ha + spredemiddel.

Burresnerre i vintersæd og vårsæd:

Trimmer® 50 SG kan blandes med Tomahawk®.

Dosering:

10-15 g 50 Trimmer® 50 SG + 0,3-0,8 l Tomahawk®/ha + spredemiddel

KORN MED UDLÆG AF GRÆS TIL FODER/"GRØNNE" MARKER

Bekæmpelsesspektrum som for korn uden udlæg. Behandling

foretages når græsset er fuldt fremspiret med 2-3 blade.

Dosering, kornets vækststadie 12-27: 10 g Trimmer® 50 SG pr. ha + spredemiddel.

Dosering, kornets vækststadie > 28: 15 g Trimmer® 50 SG pr. ha + spredemiddel.

Bemærk

Engsvingel udlæg kan hæmmes i væksten, men vil som regel vokse og udvikle sig normalt efter høst. I kløvergræs kan kløveren skades/hæmmes.

KORN MED UDLÆG AF FRØGRÆSARTERNE:

ALM. OG ITAL. RAJGRÆS, RØDSVINGEL, ENGRAPGRÆS OG HUNDEGRÆS

Udlægsåret:

I enkelte af forsøgene er der set forbigående påvirkning af udlægget, uden påvirkning af udbyttet.

Dosering: 7,5 g Trimmer® 50 SG pr. ha + spredemiddel.

evt. i tankblanding med DFF eller Tomahawk®.

Sprøjtetidspunkt: Når udlægget er fuldt fremspiret med 2-3 blade og ukrudt på 1-4 blade.

Efter høst:

I enkelte forsøg er der set en lille påvirkning af frøgræsset, og der er risiko for et lille udbyttetab ved høst.

Dosering: 7,5 g Trimmer® 50 SG pr. ha + spredemiddel.
Sprøjtetidspunkt: Når ukrudtet er i vækst igen efter høsten.

Rajgræs udlagt i ren bestand efter høst:

Godkendelsen lyder på alle nye sorter.

I enkelte forsøg er der set en lille påvirkning af frøgræsset, og der er risiko for et lille udbyttetab ved høst.

Dosering: 7,5 g Trimmer® 50 SG pr. ha + spredemiddel.

Sprøjtetidspunkt: Når udlægget er fuldt fremspiret med 2-3 blade og ukrudt på 1-4 blade.

Testene er udført med Trimmer® 50 SG. Der tages derfor et vist forbehold, men der er ikke set forskel på selektiviteten i de to formuleringer i kornforsøgene.

Trimmer® 50 SG må ikke anvendes i frøgræs, det år frøgræsset skal høstes.

SPREDE/KLÆBEMIDDEL

For at sikre den optimale effekt, tankblandes Trimmer® 50 SG altid med et sprede/klæbemiddel, dog ikke hvis der tankblandes med Boxer®.

Anbefalede: Agropol® eller Contact®

Dosering: 0,05%, som svarer til 50 mL/100 L vand

BLANDINGER MED ANDRE MIDLER

Husk altid også at læse etiketten for de produkter der blandes med, det gælder især for evt. tilsætning af olie eller sprede/klæbemiddel og mulige restriktioner i anvendelsen.

Trimmer® 50 SG kan generelt blandes med relevante ukrudts og svampemidler i korn. Der bør maksimalt blandes 2 produkter. Trimmer® 50 SG kan endvidere blandes med manganchelat og mangansulfat. Ved blanding med mangansulfat, bør der maksimalt anvendes 2 kg/100 liter vand og der anvendes ikke Sprede-/klæbemiddel.

Praktisk erfaring og forsøg har vist at Trimmer® 50 SG kan blandes med Acanto® Prima, Aproach®, Amistar®, Bell®, Boxer®, Comet®, CCC, Lexus®, Lodin®, Monitor®, Opus®, Primus®, Starane® XL, Stomp®, Tomakawk® og Zenit® samt manganprodukter.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN

Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Indtørrede hinder fra en tidligere sprøjtning kan indeholde rester, der frigøres og giver skade i en senere afgrøde. Påfyldning skal ske på plads med opsamling eller i marken. Dette gælder alment for alle produkter. Fyld tanken $\frac{3}{4}$ med vand.

Tilsæt den beregnede mængde Trimmer® 50 SG under omrøring,

når det er opløst tilsættes en evt. blandingspartner. Fyld efter med vand.

Lige før sprøjtetanken er helt fuld, tilsættes eventuelt sprede/klæbemiddel. Fortsæt omrøringen, indtil udsprøjtningen er afsluttet. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med andre midler udsprøjtes dog straks.

SPRØJTETEKNIK OG VANDMÆNGDE

Trimmer® 50 SG udsprøjtes med en teknik der sikrer en god og ensartet dækning af ukrudtsplanterne. Anvend fladsprededyser, f.eks. en ISO 110-02 dyse med et tryk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende Low-drift dyse. Hvis der bruges anden sprøjteteknik, f.eks. Danfoil, følges vedkommende vejledning.

Der anvendes normalt 100-200 liter vand per hektar. I meget tætte og kraftige afgrøder eller ved kraftig bestand af ukrudt, kan det være nødvendigt at øge vandmængden for at sikre tilstrækkelig dækning.

Anbefalede vandmængder og sprøjteteknik:

Korn (der anvendes 100 – 200 L vand pr. ha)

Dyse: ISO F - 02-110 eller ISO LD-02-110

Tryk på 2 bar og 7,8/6,3 km/time giver 100/125 L vand pr. ha

Tryk på 3 bar og 6,4/5,5 km/time giver 150/175 L vand pr. Ha
Dyse: ISO F - 025-110 eller ISO LD-025-110

Tryk på 2 bar og 6,5/4,9 km/time giver 150/200 L vand pr. ha
Tryk på 3 bar og 8,0/6,0 km/time giver 150/200 L vand pr. ha

SPRØJTEUDSTYRET

Start altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Indtørrede hinder fra en tidligere sprøjtning kan indholde rester der frigøres, og giver skade i en senere afgrøde. Dette gælder alment for alle produkter.

Straks efter endt udsprøjtning af Trimmer® 50 SG skal sprøjtemateriellet rengøres grundigt, også selv om sprøjtearbejdet fortsættes den næste dag. Dette for at hindre, at "fedthinder" og belægninger af sprøjtemidler ophobes på indersiden af beholder, i filtre, i slanger, i dyser og udvendig på sprøjten.

Er det ikke muligt at rengøre umiddelbart efter arbejdet, fyldes sprøjten helt med vand således at udtørring undgås. Sprøjten kan så rengøres inden næste arbejdsopgave. Man bør dog være opmærksom på en eventuel indtørring i filtre med videre. Sprøjten skal være korrekt justeret og udsprøjtning foretages, så overlapninger undgås.

RESISTENS

Virkemåde gruppe:

Trimmer® 50 SG indeholder aktivstoffet tribenuron-methyl, som tilhører virkemådeklasse:

HRAC gruppe: B

Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende.

Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonyleurea produkt fra HRAC gruppe: Der er fundet flere tilfælde af resistens i alm. fuglegræs, kornvalmue, lugtløs kamille samt et enkelt tilfælde af hanekro, hydrdetaske og gul okseøje.

Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men med samme effekt over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af disse to midler.

Anbefalinger

- 1) Hvis der er konstateret resistens over for Trimmer® 50 SG, genbehandles marken hurtigst muligt med et andet effektivt middel mod denne ukrudtsart. Se nedenfor under forebyggelse.

- 2) For at forebygge, at der opstår resistens, anvendes Trimmer® 50 SG i tankblanding efter følgende retningslinjer:

Efterårsanvendelse:

To-kimbladet ukrudt: Der tankblandes med diflufenican eller eventuelt med et bredspektret græsmiddel der også bekæmper to-kimbladet ukrudt

Forårsanvendelse:

For nuværende anbefales det at udsprøjte Trimmer® 50 SG i tank mix med anbefalet dosering af Tomahawk®.

Valg af middel og dosering tilpasses efter ukrudt, afgrødevalg og sprøjteforhold.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR EFTER TRIMMER® 50 SG

Alle sprøjter skal nu have tankspuledyse, og rentvandstank svarende til 10 - 15 % af tankens kapacitet, som sikrer at tilstrækkelig indvendig rengøringen kan ske i den behandlede mark. Sprøjten skal skylles/vaskes i et sådant omfang, at restkoncentrationen i tanken ikke overskrider en koncentration på 2 % af den oprindelige sprøjtevæske. Dette kan gøres ved at dele det rene vand i 3 skylninger/vaske, hvor tanken tømmes helt imellem hver skylning/vask.

INDVENDIG RENGØRING AF SPRØJTEN

BEMÆRK! Husk at aktivere alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske.
2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca. 1/3 af det rene vand. Skyllevandet sprøjtes udover den afgrøde, der lige er sprøjtet.
3. Fyld næsten 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,5 liter ALL CLEAR™ EXTRA. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde der lige er behandlet.
4. Skyl tanken grundigt med sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet udover den afgrøde der lige er behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken.
5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et nyt sted hver gang og pas på afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand). Rengøringen kan også ske hjemme på en plads med opsamling af vaskevand enten i gyllebeholder eller separat beholder. En uvasket sprøjte skal opbevares under tag, eller i marken på det areal der lige er behandlet.

6. Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR™ EXTRA pr. 10 liter vand.

Bortskaffelse af tom emballage og rester

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

EAK-kode: 02010500

FORHOLDSREGLER

Ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unge menneskers farlige arbejde, må midlet ikke anvendes af unge under 18 år. Undtagelser - se Arbejdstilsynets vejledning: "Sikkerhed og Bekæmpelsesmidler".

ved fremstilling af sprøjtevæsken anvendes: Handsker, støvler og evt. beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

ved udbringning anvendes:

Marksprøjte (spredebom på traktor, bom < 1 m over jordoverfladen, tryk < 3 bar):

Handsker, støvler og overtræksbukser. Hvis førerhuset er lukket, anvendes handsker og overtræksbukser kun uden for førerhuset. Se også Arbejdstilsynets vejledning: "SIKKERHED OG BEKÆMPELSESMIDLER".

- **ved transport:**

ADR/RID: UN 3077 Miljøfarligt fast stof n.o.s. (indeholder tribenuron methyl), 9, III.
TREMCARD: 90GM7-III-A.

BRAND

Evakuer området straks, og tast 112. Fortæl, at der er sprøjtemidler på brandstedet, og om der evt. er andre farlige stoffer som f.eks. gødning.

Passende slukningsmidler: CO₂, pulver, vandtåge eller skum. Nedkøl beholdere/tanke med vandtåge.

Anvend så lidt vand som muligt, og undgå at det kommer i kloak, brønde eller vandløb.

Under slukningen anvendes beskyttelsesdragt og luftforsynet åndedrætsværn. Undgå indånding af røg/damp da den indeholder kulilte og kvælstofilter. Hold nysgerrige udenfor røgfanen.

Hvis der er tale om en kraftig brand og betingelserne i øvrigt tillader det, bør ilden selv brænde ud, da vand vil øge det forurenede område.

SPILD

Ved spild skal den videre spredning straks standses. Kommer produktet i vådområder, kloak eller lignende, kontakt da straks kommunens tekniske forvaltning, brandvæsen eller politi. Spildt granulat fejes sammen og opsamles sammen med eventuelt forurenede jord i tæt lukket beholder med spændelåg som afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald.

Hvis der er spildt nær værdifulde beplantninger, fjernes straks 5 cm af jordoverfladen.

Ved håndtering af produkt og spild anvendes handsker, støvler og evt. beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

® = Registrerede varemærker af

Acanto®, Ally®, Aproach®, Express®, Harmony®, Lexus® -

E.I. du Pont de Nemours & Co.;

All Clear™ Extra - Service Chemicals;

Bell, Comet®, Opus®, Stomp® - BASF;

Tomahawk® - ADAMA Agan Ltd.;

Amistar®, Boxer®, Zenit® - Syngenta Ltd.;

Starane®, Primus® - Dow AgroSciences LLC;

Monitor® - Monsanto;

Lodin® - United Phosphorus Ltd.;

Trimmer® - ADAMA Agan Ltd.

Trimmer® 50 SG

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af frøgræs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Analyse:
tribenuron-methyl 500 g/kg (50% w/w)
Formulering:
midlet er et vandopløseligt granulat
Ukrudtsmiddel: nr. 3-184
Virkemåde: HRAC B

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Fabrikationsnr. og fabricationsdato: se etiketten på kassens modsatte side.
Holdbarhed: produktet er holdbart til mindst 2 år efter fabricationsdato.

Registreringsindehaver:
DuPont Danmark ApS
Langebrogade 1,
DK-1411 København K,
Tlf. 32 66 20 00,
www.dupontagro.dk

Importør/Distributør:
ADAMA Northern Europe B.V.
Arnhemseweg 87
NL-3832 GK Leusden
The Netherlands
www.adama.com

© ADAMA Agon Ltd.

10 x 100 g



ADAMA

ANETRM5GDDK100G/02/C1

TRIMMER® 50 SC

Trimmer® 50 SG

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af frøgræs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervs-mæssigt og kræver gyldig autorisation.



Analyse:
tribenuron-methyl 500 g/kg (50% w/w)
Formulering:
midlet er et vandopløseligt granulat
Ukrudtsmiddel: nr. 3-184
Virkemåde: HRAC B

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Holdbarhed: produktet er holdbart til mindst 2 år efter fabrikationsdato.

Registreringsindehaver:
DuPont Danmark ApS
Langebrogade 1,
DK-1411 København K,
Tlf. 32 66 20 00,
www.dupontagro.dk

Importør/Distributør:
ADAMA Northern Europe B.V.
Arnhemseweg 87
NL-3832 GK Leusden
The Netherlands
www.adama.com

Scan for brug



© ADAMA Agan Ltd.

10 x 100 g

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).


Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Bær beskyttelseshandsker (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.



Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af frøgræs. ● Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. ● Må i korn samt korn med udlæg af frøgræsser ikke anvendes senere end 6 uger før høst, for helsæd dog ikke senere end 4 uger før høst. ● Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Den maksimale dosis i vårafgrøder i vækststadiet 12-27 er 10,0 g Trimmer 50 SG/ha og i vækststadiet 28 er den 15,0 g Trimmer 50 SG/ha. For vinterafgrøder er den maksimale dosis om efteråret 7,5 g Trimmer 50 SG/ha i vækststadier over 11. Om foråret er den maksimale dosis 13,5 g Trimmer 50 SG/ha i vækststadiet 12-29 og 15,0 g Trimmer 50 SG/ha i vækststadiet 30. ● For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl. ● Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). ● Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). ● Opbevares utilgængeligt for børn (P102). ● Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

UN 3077



8 718077 003832 >




DENMARK

ANETRMMSGDK100G/02/C2

Fabrikationsnr./
Fabrikationsdato:

TRIMMER® 50 SG



DENMARK

135 x 1 KG



8 718077 010700 >



ADAMA

Northern Europe B.V.

ANETRMMSGDK100G/02/X