

Etikette nr: 1
GODKENDT
17. marts 2016

for pakninger på
Miljøstyrelsen 100g,
500g,
1kg &
2kg

TURF WPG

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme, forårsaget af *Pythium*, *Phytophthora*, *Rhizoctonia*, *Fusarium* og gråskimmel (*Botrytis cinerea*) i grøntsager, krydderurter og pryddplanter, samt til bekæmpelse af agurkesyge (*Didymella bryoniae*) i agurker.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Svampemiddel nr. 575-7.

Indeholder *Gliocladium catenulatum* stamme J1446 (32% w/w), 10^7 - 10^9 CFU/g.

Præparattype:	Midlet er et vanddispergerbart pulver.
Brugergruppe:	Professionelle brugere
Nettoindhold:	1 kg
Godkendelsesindehaver:	Verdera Oy, Kurjenkellontie 5B, P.O. Box 5, FI-02271 ESPOO, Finland.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Indeholder *Gliocladium catenulatum* J1446; kan udløse en allergisk reaktion.

Undgå indånding af støv/spray (P261).

Undgå kontakt med huden.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme, forårsaget af *Pythium*, *Phytophthora*, *Rhizoctonia*, *Fusarium* og gråskimmel (*Botrytis cinerea*) i grøntsager, krydderurter og pryddplanter, samt til bekæmpelse af agurkesyge (*Didymella bryoniae*) i agurker.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+P352).

Verdera



LALLEMAND PLANT CARE

BRUGSANVISNINGER

ANVENDELSESOMRÅDE: Til bekæmpelse af svampesygdomme, forårsaget af *Pythium*, *Phytophthora*, *Rhizoctonia*, *Fusarium* og gråskimmel (*Botrytis cinerea*) i grøntsager, krydderurter og prydblister, samt til bekæmpelse af agurkesyge (*Didymella bryoniae*) i agurker.

FOREBYGGELSE AF MILJØSKADER: For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Foruren ikke vandløbene med produktet eller dets emballage.

BORTSKAFFELSE: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

OPBEVARING: Turf WPG-præparat er et biologisk produkt, som indeholder levende, tørrede *Gliocladium catenulatum* - svampe. Opbevares tørt og køligt, under +8°C. I uåbnet emballage bevarer præparatet sin effekt i 12 måneder. Indholdet i en åbnet emballage anbefales brugt straks efter åbningen.

BLANDINGS- OG PÅFØRINGSVEJLEDNING: Turf WPG blandes med vand før brug. Turf WPG tilberedes således, at pulveret først kommes i en lille mængde vand (f.eks. 1 liter) og omrøres kraftigt indtil blandingen er jævn. Derefter spædes den op til den endelige brugskoncentration. Opløsningen kan fordeles med sprøjte, ved vanding, via drypvanding eller ved blanding i voksemediet. I et drypvandingssystem tilsættes opløsningen via en blandingstank eller separat injektionspumpe. Bland ikke Turf WPG i en stærk næringsopløsning.

Blandingens koncentration	Blandingsforhold	
	Turf WPG-pulver	Vand
0,5%	100 g	20 liter

BEKÆMPELSE AF AGURKSYGE PÅ AGURKER OG GRÅSKIMMEL PÅ TOMATER, PAPRIKA OG AGURKER: Stammen, især stambasen når det gælder sortpletet råd, sprøjtes med 0,5 % Turf WPG med fokus på sårstederne. Anvend ca 10 liter til 500 planter. Den første sprøjtning udføres straks efter udplantning eller senest efter, at der første gang er fjernet blade. Behandlingen gentages med 3-4 ugers mellemrum.

BEKÆMPELSE AF GRÅSKIMMEL PÅ PRYDPLANTER OG SMÅPLANTER AF GRØNTSAGER: Anvend 0,5 % opløsning. Stiklinger behandles i stiklingsfasen, småplanter ved udplantningen. Behandlingen gentages efter behov med 3-4 ugers interval. Stiklinger kan også dyppes i 0,5 % opløsning før udplantning. Behandling af stiklinger anbefales kun til urteagtige vækster.

BEKÆMPELSE AF RODSYGDOMME: Bedste tidspunkt for behandling er ved såning-, kultivering- og/eller udplantningstidspunktet. Behandlingen gentages med 3-4 ugers mellemrum.

ANBEFALEDE MÆNGDER: I agurker, tomater, paprika og prydvækster anvendes 200-250 g Turf WPG/1000 planter. Ved blanding i vækstmediet anvendes der 200-500 g pulver/m³. For at være sikker på at præparatet fordeles jævnt, blandes Turf WPG i vækstmediet efter opløsning i vand. Stiklinger behandles med 5-10 g Turf WPG/m² i forbindelse med vandingen (vandmængden tilpasses vækstmediets vandindhold). Hvor der er tale om enkelte planter i plantebeholdere eller krukke, vædes vækstunderlaget med f.eks. 0,5 % Turf WPG. Mængden afhænger af krukken, beholderens eller rodklumpens størrelse jf. følgende tabel:

Pottestørrelse (vol)	Liter 0,5% Turf WPG pr. 1000 planter	Gram Turf WPG pr.1000 planter
100 ml	4-10	20-50
250 ml	10-25	50-125
500 ml	20-50	100-250
1 liter	40-100	200-500

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER: Ved håndtering af præparatet skal der anvendes beskyttelsesdragt, gummistøvler, gummi- eller plasthandsker (f.eks. nitril) samt hovedbeklædning. Ved arbejdsopgaver, hvor luftvejene kan blive påvirkede, bør der også benyttes åndedrætsværn med P2/A2 filter.

BEMÆRKNINGER: Turf WPG anvendes i forebyggende øjemed. Præparatet er egnet til brug i integreret bekæmpelse. Du kan få mere information om kompatibilitet hos Verdera Oy. Præparatet er ikke skadeligt for bekæmpelsesorganismer. Må ikke anvendes som tankblanding med andre vækstbeskyttelsesmidler eller koncentreret næringsopløsning.

Begrænsninger i anvendelsen:

Må ikke bruges til stiklinger uden rødder. Må ikke bruges till stiklinger af træagtige vækster.