

# Valbon

## Brugsanvisning

Valbon er et vandblandbart granulat indeholdende to aktivstoffer: Bentiavalicarb og mancozeb. Produktet anvendes til bekæmpelse af kartoffelskimmel ved forebyggende behandlinger.

### Tidspunkt for behandling

Valbon skal udbringes før angreb opdages. Den første behandling udføres typisk, når der er konstateret begyndende angreb i området, eller varsling indikerer gunstige skimmelforhold. Første behandling skal dog senest udføres inden rækkelukning.

Efterfølgende behandlinger udføres med 7-10 dages interval afhængigt af nytilvækst og smittetryk. Der må maksimalt anvendes 6 behandlinger i løbet af en sæson. Valbon kan med fordel indgå i et sprøjteprogram med andre midler.

### Dosering

1,6 kg Valbon pr. ha.

### Vandmængde

Der anvendes 200-400 l vand pr. ha i konventionelle sprøjter. Da Valbon er et kontaktmiddel, er det vigtigt at kartoffelplanterne dækkes godt med sprøjtevæsken.

Valbon kan også anvendes i luftassisterede sprøjter.

### Resistensstrategi

For at undgå resistensopbygning anbefales det maksimalt at anvende Valbon i halvdelen af det samlede antal sprøjtninger og med maksimalt 6 behandlinger pr. år.

### Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld sprøjtetanken med halv vandmængde. Tilsæt Valbon under omrøring. Fyld derefter op med vand. Hold omrøring i gang under påfyldning og udsprøjtning.

### Bortskaffelse

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovationen.

### Opbevaring

Opbevares tørt og frostfrit.