

# Zolone® Flo

## Insektmiddel

**Må kun anvendes mod visse skadegørere i kernefrugt og prydblplanter.**

### Analyse:

Fosalon ..... 500 g/ltr

(Vandbaseret formulering).

Midlet er flydende

Nettoindhold: **12 x 1 liter**

### ADVARSEL

Insektmiddel, nr. 11-22  
Omfattet af Miljøministeriets  
bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

**Før at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.**

Farlig ved indånding og ved indtagelse (R20/R22)

Meget giftig for organismer, der lever i vand (R50)

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R53)

Undgå indånding af aerosoltåger (S23)

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37)

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpilgigtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes til bekæmpelse af visse skadegørere i kernefrugt og prydblplanter. Behandling af kernefrugt må ikke foretages senere end 4 uger før høst.**



Xn



Sundhedsskadelig

N



Miljøfarlig

**Produktet må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandløb og søer.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Opbevares utilgængeligt for børn.**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

**Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllvandet hældes op i sprøjtevæskan.**

© = Reg. varemærke for Cheminova A/S  
Fabrikationsdato + Batch nr.: Se pakningen.

**Skal opbevares tørt og frostfrit  
UN 3018**

### Producent:

**CHEMINOVA**

Cheminova A/S

P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Danmark

Tel. +45 96 90 96 90

### Distribution, salg og rådgivning:



**Nordisk Alkali**

Middelbovej 1, 8900 Randers  
Tlf 8642 5692 / 4649 1171  
www.nordiskalkali.dk

### FØRSTEHJÆLP

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket (S46).

### Første forgiftningssymptomer:

Ildebefindende, kvalme, sved, spyttflod, diarré, åndedrætsbesvær, små pupiller og muskeltrækninger.

### Indånding:

Ved indånding flyttes personen til frisk luft, og der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende.

### Indtagelse:

Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og der søges lægehjælp. Giv rigelig vand at drikke, og fremkald ikke opkastning. Oplys, at stoffet tilhører stigmingergruppen, hvor atropin kan benyttes som modgift.

### Hudkontakt:

Ved kontakt med huden fjernes gennemvædet tøj, huden vaskes med vand og sæbe og der søges læge ved fortsat ubehag.

### Øjenkontakt:

Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser under skylning, og søg læge.

### BRUGSANVISNING

#### Afgrøder

Zolone Flo kan anvendes i æbler, pærer og prydblplanter.

#### Anvendelsesområde og virkningsspectrum

Zolone Flo bekæmper bl.a. larver af viklere, bladvepse og frostmåler i æbler og pærer samt bladlus i prydblplanter og kernefrugt.

#### Nyttedyr

Zolone Flo er skånsom mod næbtæger, guldojer, mariehøns, ørentviste, blomstertæger, og svirrefluer. Zolone Flo er ikke forenelig med anvendelse af rovmidler og snyltevepse.

#### Virkemåde

Zolone Flo er et kontaktmiddel, som optages gennem insektets hudskellet eller ved indtagelse gennem føden, og påvirker insektets centralnervesystem.

#### Sprøjteteknik

**Kernefrugt:** Zolone Flo udsprøjttes tidligt i sæsonen i åbne afgrøder med 150-200 ltr vand pr. ha, og senere i sæsonen i tætte afgrøder med 200-400 ltr vand pr. ha. Størst vandmængde ved udsprøjtning i køligt vejr.

**Prydblplanter:** Zolone Flo udsprøjttes til adfrytning.

Vær opmærksom på, at Zolone Flo er et kontaktmiddel, hvorfor det er vigtigt at benytte en sprøjteteknik, der sikrer god dækning af skadedyrene og afgrøden.

#### Tålsomhed

Det anbefales altid at foretage en prøvesprøjtning på et mindre antal planter forud for behandling af hele arealet. Planternes tålsomhed kan variere med årstiden, klimaforhold, ernæringsstilstand, sorter o.a. Zolone Flo bør i prydblplanter i væksthus ikke anvendes under planternes blomstring af hensyn til risikoen for blomsterskader.

### Sprøjtetidspunkt

Zolone Flo anvendes i æbler og pærer i stadium grøn spids til tæt klynge eller dunet til glat frugt, samt i prydblplanter før blomstring. Der sprøjtes ved begyndende angreb eller ved varseling.

### Dosering

Zolone Flo udsprøjttes med 1,5-2,0 ltr/ha afhængig af skadevolder. (Se doseringsskema).

Ved sprøjtning mod de anførte insekter i kernefrugt opnås en sideeffekt på frugttræsspinde-mider.

### Doserings- og anvendelseskema

I æbler og pærer	Tidligt i sæsonen	
	Før blomstring	Senere i sæsonen Efter blomstring
Ferskenbladlus		
Æbleknopbladlus		
Rød æblebladlus	1,5 ltr/ha	2,0 ltr/ha
Grøn æblebladlus		
Rød pærebladlus		
Frostmåler		
Larver af knopvikler		
Larver af æblevikler	2,0 ltr/ha	2,0 ltr/ha
Larver af syrebladveps*		
Larver af æblebladveps*		
Larver af pærebladveps*		
<b>Prydblplanter</b>	Sprøjtning ved begyndende angreb.	
Bladlus**	0,125% styrke (f.eks. 125 ml pr. 100 ltr vand)	

\* **Bemærk:** Imod bladvepse kan ikke forventes mere end 70-85% effekt, hvilket ikke altid vil være tilfredsstillende. Hvor bladvepse er et stort problem, anbefales det at gentage behandlingen med Zolone Flo.

\*\* **Bemærk:** Nedsat effekt må forventes hvis midlet anvendes til at bekæmpe organofosfat- eller pyrethroid resistente ferskenbladlus.

### Blandinger

Zolone Flo bør ikke blandes med andre midler.

### Klimaets indflydelse

Den bedste effekt opnås ved udsprøjtning i varme perioder, når insekternes aktivitet er høj. Temperaturen bør ikke være under 8°C da dette vil påvirke effekten af produktet.

### Tilberedning af sprøjte væske

Fyld sprøjtet halv op med vand, tilsæt den afmaltede mængde Zolone Flo og efterfyld. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen. Sprøjte væsken bør bruges umiddelbart efter opblandning.

### Bortskaffelse af den tomme emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllvandet hældes op i sprøjte væsken.

**Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse. Det gælder også ved anvendelse under unormale kulturbetingelser.**